

что-бы предполагать существование причинной связи между этими явлениями.

9) Воспаление оболочекъ при опухоляхъ встречается рѣдко; въ тѣхъ случаяхъ, когда оно встречается, оно носить характеръ мѣстнаго менингита, локализованнаго въ области развитія опухоли, и не играетъ роли въ возникновеніи неврологическихъ явлений.

10) Есть данные предполагать, что уменьшеніе остроты зрѣнія и отечность зрительного соска болѣе или менѣе независимы другъ отъ друга.

11) Атрофія зрительного нерва, по крайней мѣрѣ въ некоторыхъ случаяхъ, представляетъ обычную исходящую атрофию, начинающуюся отъ chiasma ner. op.

12) Возрастъ пациента самъ по себѣ не играетъ роли при возникновеніи пневрита.

*B. Лихницкій.*

G. Bonch . Случай подостраго комбинированнаго склероза въ связи съ anaemia perniciosa. Un cas de scl rose combin e subaigue associ e   l'an mie perniciuese.—Journal de neurologie. 1909, № 5.

Первые признаки заболѣванія появились около 3-хъ лѣтъ тому назадъ; въ настоящее время со стороны первной системы имѣются слѣдующія симптомы: paraplegia spastica, повышеніе сухожильныхъ рефлексовъ; отсутствіе разстройствъ со стороны сфинктеровъ. Разстройства кожной чувствительности незначительны: легкое пониженіе тактильной чувствительности; болевая и температурная—нормальны. Рѣзкія разстройства мышечнаго и артикулярнаго чувства, атаксія рукъ и ногъ. Стрѣляющія боли въ нижнихъ конечностяхъ; атрофія мускуловъ ногъ. На основаніи этихъ симптомовъ авторъ дѣлаетъ заключеніе, что въ данномъ случаѣ поражены слѣдующія системы: пирамидальные пути, задніе столбы и прямые мозжечковые пути. Авторъ указываетъ, что случаи перерожденій проводящихъ путей спиннаго мозга въ связи съ anaemia perniciosa впервые описаны англійскими авторами. Особенностями данного случая являются: 1) сравнительно медленное развитіе заболѣванія и 2) стрѣляющія боли въ нижнихъ конечностяхъ.

*B. Лихницкій.*

A. M. Виршубскій. Случай первичнаго периферического заболѣванія слухового нерва.—Практическій Врачъ. 1909 г. № 37.