

ствования прогрессивнаго паралича и сифилиса,—но во всякомъ случаѣ реакція является очень важнымъ доказательствомъ.

Проф. П. И. Ковалевскій.

**Dr. Myers, Fischer, Duffendorf.** Вопросъ автоинтоксикаціи при острыхъ депрессивныхъ психозахъ. The question of autointoxication in acute depressive psychoses.—American journal of insanity, 1909, 4.

Авторы имѣли въ виду добиться, какой причинный моментъ дѣйствуетъ при самоотравленіи въ психозахъ остраго депрессивнаго типа. Ислѣдованія послѣдняго времени показали, что въ подобныхъ случаяхъ находили въ кишечникѣ продукты разложенія, въ формѣ іодола, скотола, фенола и проч.; но какимъ образомъ эти вещества дѣйствуютъ на организмъ остается не яснымъ. Несомнѣнно, не наличие только этихъ продуктовъ разложенія является главнымъ факторомъ. Наблюденія показали, что при этомъ важную роль играли: 1. Недостатокъ окислительной способности со стороны кѣлокъ организма и 2. идеосинкрязія субъекта, или дегенеративная и повышенная чувствительность нервной системы. Кроме того отравленіе можетъ происходить ядами, доселѣ въ организмѣ не найденными. Инфекціонные психозы, какъ лихорадочный бредъ, постфебрильный бредъ, бредъ послѣ тифа, пневмоніи, инфлюэнцы и проч., ясно доказываютъ отравленіе нервной системы бактеріальными агентами. Вопросъ, однако, остается открытымъ, дѣйствуютъ ли отравляющіе токсины, выработанные микроорганизмами, или же дѣйствуетъ аутоотоксинъ, развивающійся въ организмѣ, какъ результатъ заразной болѣзни. Клиническая картина и сущность психозовъ, обязанныхъ своимъ происхожденіемъ продуктамъ кишечнаго разложенія, этиологически аналогичны инфекціоннымъ психозамъ. Личныя ислѣдованія и анализы авторовъ убѣждаютъ, что въ психозахъ автоинтоксикаціи или инфекции роль воздѣйствующаго фактора имѣло самоотравленіе,—но пока нельзя утверждать въ положительности, чтобы этотъ факторъ игралъ роль возбудителя психозовъ.

Проф. П. И. Ковалевскій.

**Dr. Gilmore.** Психическіе симптомы въ Вазедовой болѣзни и ихъ леченіе The mental symptoms in coser of exophthalmic goitre and their treatement.—The journal of mental science, 1909.

По мнѣнію автора, бываютъ случаи, когда у базедовиковъ душевное разстройство предшествуетъ появленію самой триады. Эти душевныя ненормальности выражаются слѣдующимъ: возбужденіе, безповойство, неспособность сосредоточиться долго на одномъ предметѣ, перескакиваніе отъ дѣла къ дѣлу, отъ мысли къ мысли, смѣняемость подавленнаго состоянія веселымъ и наоборотъ, безъ достаточныхъ къ тому причинъ, болтливость, крайняя подвижность мыслей, какъ бы „хорея идей“ (*Russel Reynold*), бессонница, тяжелыя сновидѣнія, раздражительность, подозрительность, недовѣріе и злобность. Въ большинствѣ больные сами сознаютъ эти свои болѣзненные явленія. *Graves* указываетъ на частое появленіе истерическихъ явленій при пораженіи щитовидной желѣзы. Количество душевныхъ разстройствъ при Базедовой болѣзни различными авторами указывается различно. *Murray* на 180 случаевъ Базедовой болѣзни нашелъ 3 психоза и 10 галлюцинантовъ. У автора на 750 случаевъ Базедовой болѣзни было 5 случаевъ психоза; у *Roger* на 600—13 случаевъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ психозъ появляется на подготовленной почвѣ. Изъ психозовъ наблюдались меланхолія, спутанность и проч. Исходъ болѣе или менѣе благоприятный. Лечение должно быть индивидуальнымъ. Требуется: покой, пребываніе въ постели на свѣжемъ воздухѣ, пока пульсъ не ниже 90'. За тѣмъ постепенно поднимаютъ больного на 1—2 часа. Изъ медикаментовъ авторъ совѣтуетъ салициловые препараты, легкія дозы хины, броматы съ беладонной; иногда іодаты, а также дезинфицирующія вещества для кишечника. Авторъ пользовался не безъ успѣха сывороткой *Möbius'a*; точно также въ четырехъ случаяхъ авторъ имѣлъ успѣхъ при питаніи больныхъ молокомъ козъ, у которыхъ удалена щитовидная железа, на что раньше было указано *Lanz'омъ*.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Hughes. Dementia, amentia and destrumentia.—The Alienist and Neurologist, 1909.

Слово dementia и до настоящаго времени примѣняется очень различно и по отношенію къ состояніямъ, далеко не равноцѣннымъ. Деменція, повидимому, полный упадокъ умственной дѣятельности, а между тѣмъ иногда этотъ же терминъ употребляется и для легкихъ случаевъ paresis mentis.