

люди съ средними и выше среднихъ умственными способностями, но нервные и неустойчивые, истеричные, ипохондрики, — III) люди съ недостаточными умственными способностями и неустойчивою нервною системою, — IV — притупленіе умственныхъ способностей, спокойствіе, безразличное настроеніе.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Griffith. Мысли о самоубійствѣ Thought on Suicede, — The alienist and neurologist, 1909.

Мнѣніе автора о самоубійствѣ представляетъ тотъ интересъ, что авторъ самъ дважды покушался на самоубійство. Самоубійство—явленіе довольно частое. Въ соединенныхъ Штатахъ ежедневно совершается 125 самоубійствъ. Въ однихъ случаяхъ самоубійства совершаются быстро, немедленно по появленіи импульса къ самоубійству, — другой разъ побужденіе длится два—три года, пока выразится въ окончательной формѣ. Въ этихъ случаяхъ тщательно взвѣшиваются время, мѣсто, обстоятельства и условія обстановки для производства акта. Особенно часто покушаются на самоубійство пьяницы, при чемъ въ однихъ случаяхъ это дѣлается въ промежуткахъ между приступами, какъ выраженіе раскаянія, — въ другихъ случаяхъ—въ состояніи запоя, или послѣ кутежа. Есть личности, которыя обращаются къ врачу за поддержкою, при сознаніи собственного недостатка воли, — и только они исполняютъ запретъ врача. (Мнѣ лично извѣстно три случая, когда слабовольные самоубійцы обращались ко мнѣ за разрѣшеніемъ привести въ исполненіе ихъ замыселъ и приводили его тогда, когда я или бывалъ въ командировкахъ, или уѣзжалъ за границу. Реф.). Съ авторомъ были такіе случаи. Однажды по его винѣ на фабрикѣ огромный ящикъ съ хлопчатой бумагой, въ 400 п., упалъ съ высоты третьяго этажа. Первымъ инстинктивнымъ его движеніемъ былъ крикъ, предупреждающій внизу людей объ опасности, — вторымъ — побужденіе броситься внизъ вслѣдъ за падающимъ предметомъ. Спустя нѣсколько лѣтъ, авторъ проходя по мосту, подвергся импульсу — броситься внизъ. По мнѣнію автора, для слабовольныхъ людей поддержка врача можетъ имѣть весьма важное значеніе.

Проф. П. И. Ковалевскій.