

гими, вслѣдствіе пониженной сопротивляемости организма прогрессивныхъ паралитиковъ. Установленіе специальной пейротоксичности этой бациллы не есть еще полное доказательство ея специфичности для прогрессивнаго паралича.

Проф. П. Й. Ковалевскій.

### ТЕРАПІЯ.

**Dr. Kellner.** Успѣшное излеченіе эпилептиковъ и необходимость устройства лечебницъ для эпилептиковъ Zeitschr. f. d. Erforschung und Behandlung d. jugendlichen Schwachsinn. B. II. 1908.

Вопросъ о леченіи и возможности излеченія эпилептиковъ до сихъ поръ представляется въ странномъ положеніи. Въ руководствахъ по нервнымъ болѣзнямъ мы читаемъ о неизлечимости болѣзни и только для очистки совѣсти рекомендуются большія дозы брома, причемъ тутъ же присоединяется, что эти дозы могутъ обусловливать ослабленіе памяти и едва ли не слабоуміе,—съ другой стороны мы читаемъ отчеты специалистовъ, въ которыхъ говорится о достаточномъ процентѣ излеченія эпилептиковъ. Все дѣло въ томъ, что эпилептиковъ лечатъ или дома, или въ домахъ умалищенныхъ. Дома далеко не всегда представляютъ всѣ удобства для леченія,—помѣщать же въ дома умалищенныхъ эпилептиковъ не душевно-больныхъ едва ли человѣчно. Авторъ настаиваетъ на устройствѣ лечебницъ для эпилептиковъ специальнно. Такія лечебницы въ значительномъ количествѣ устроены, какъ въ Германіи, такъ и въ другихъ государствахъ. Изъ лечебныхъ средствъ оказываются пользу опій и бромъ. Авторъ—старшій врачъ Гамбургскаго заведенія для эпилептиковъ и идиотовъ, причемъ онъ настойчивымъ леченіемъ получилъ въ 27% преkrашеніе судорожныхъ припадковъ,—въ 16% значительное улучшеніе,—въ 23—29% припадки появлялись рѣже и слабѣе,—безуспешнымъ лечение оказалось въ 7,5%.

Проф. П. И. Ковалевскій.

**A. Rodiet.** Вліяніе вегетаріанскаго режима на характеръ и temperamentъ эпилептиковъ. De l'action du régime végétarien sur le caractère et le tempérément des épileptiques.—Journal de neurologie. 1909, № 12.

Въ началѣ статьи авторъ приводить выдержки изъ монографіи проф. A. Gautier—о питаніи и режимѣ, въ которой

собранъ цѣлый рядъ примѣровъ, показывающихъ вліяніе животной и растительной пищи, какъ на характеръ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ націй и даже животныхъ. Далѣе *Rodiet* резюмируетъ свои наблюденія надъ 11 женщиныами-эпилептиками, которыхъ онъ наблюдалъ въ больницѣ *Saint-Jon.* У троихъ изъ нихъ былъ обычный, спокойный, равный характеръ, остальные 8 представляли особенности, характерные для эпилепсіи: овѣ то бывали угрюмы и молчаливы, то дѣлались раздражительными и агрессивными. Ровно по мѣсяцу всѣ они пробыли на строгомъ вегетаріанскомъ режимѣ—въ ихъ питаніе не входило ни молока, ни мяса, а исключительно продукты, доставляемые растительнымъ царствомъ. Результаты получились слѣдующіе: какъ у 3-хъ больныхъ, не представлявшихъ и прежде особенностей эпилептическаго характера, такъ и у 4 хъ изъ 8-ми, относящихся ко 2-й группѣ, вліяніе вегетаріанского режима ни въ чёмъ не оказалось. За то въ остальныхъ 4-хъ случаяхъ наступило значительное улучшеніе, онѣ стали общительнѣе, веселѣе, менѣе угрюмы и раздражительны.

*B. Лихницкій.*

*R. von den. Velden.* Наблюденія надъ эпилептиками. Значеніе хлористаго натрія при нѣкоторыхъ формахъ эпилепсіи. Ein Beitrag zur Bedeutung des Chlornatrium f眉r gemisse Formen der Epilepsie—Deutsche Zeitschrift f眉r Nervenheilkunde, Bd. 38, 1909.

Въ началѣ статьи авторъ останавливается на цѣломъ рядѣ изслѣдований о вытѣсненіи бромидами хлоридовъ, находящихся въ организмѣ, изслѣдований, заставлявшихъ признавать специфическое, токсическое дѣйствіе брома на нервные элементы. Раздражая непосредственно сѣрое вещество головного мозга тренированныхъ животныхъ, *Rosenthal* подтвердилъ эти наблюденія экспериментальными данными. Но опыты на животныхъ, опубликованные *Wyss'омъ* въ 1908 году, даютъ возможность предполагать, что эффектъ бромистой терапіи зависитъ не отъ лечебныхъ свойствъ самого брома, а оттого, что соли брома вытѣсняютъ изъ организма часть хлористаго натрія, который является вреднымъ для эпилептиковъ.

Авторъ хотѣлъ подтвердить эти экспериментальные данные клиническими наблюденіями надъ эпилептиками и выбралъ для этого 6 больныхъ, страдавшихъ генуинной эпилепсіей; всѣ случаи были сравнительно свѣжіе. Количество поваренной соли