

Чтобы объяснить появление спастическихъ симптомовъ, авторъ высказываетъ предположеніе о существованіи менингита или начинающагося sclerosis disseminata. Вмѣстѣ съ явленіями периферического неврита въ началѣ заболѣванія развился Корсаковскій симптомокомплексъ.

B. Лихницкій.

Lallement. Электротерапія функціональныхъ судорогъ. Electroth rapie dans les spasmes fonctionnelles.—Arch. d'Electric. M dical, 1909, стр. 138.

Рассматривая различные способы примѣненія электричества при профессіональныхъ судорогахъ, предложенные Erb'омъ, Larat, Vigouroux, Onimus и др., авторъ приходитъ къ заключенію, что ни одинъ изъ нихъ не оказывается пригоднымъ для всѣхъ случаевъ, а что наиболѣе удачные результаты даётъ комбинація различныхъ методовъ. Исходя изъ такихъ соображеній, онъ предлагаетъ слѣдующій планъ лечения: 1) статическая ванна, для улучшения общаго состоянія больного, 2) мѣстное примѣненіе тока высокаго напряженія въ теченіе 5 минутъ, 3) гальванизація, также 5 мин. (анодъ на пораженные мышцы, катодъ на предплечье), 4) вибраціонный массажъ пораженныхъ мускуловъ. Для иллюстраціи получаемыхъ съ помощью такого метода результатовъ авторъ приводитъ 2 случая писчей судороги, въ которыхъ было достигнуто полное выздоровленіе, давшее пациентамъ возможность возобновить прежнія занятія, которыхъ они вслѣдствіе своего заболѣванія принуждены были оставить. Достигнутые результаты въ 1-мъ случаѣ держатся уже 6 лѣтъ, во 2-мъ около $1\frac{1}{2}$ года.

B. Лихницкій.

M ret. Лицевая невралгія, изл ченная токомъ большей частоты. Neuralgie faciale qu rite par le courant, continu a haue fr quence.—Archives d'electr m dic. 1909, стр. 419.

Случай упорной двусторонней невралгіи тройничного нерва, тянувшейся 5 мѣсяцевъ; полное исчезновеніе болей послѣ 10 сеансовъ мѣстного примѣненія токовъ высокаго напряженія по методу Bergonier.

Методъ Bergonier по словамъ автора при упорныхъ невралгіяхъ даетъ результаты, не уступающіе тѣмъ, которые получаются при впрыскиваніяхъ алкоголя. *B. Лихницкій.*