

гін;—въ тяжелыхъ же формахъ участіе врача въ борьбѣ съ наступившими разстройствами ограничивается лишь симптома- тическими мѣропріятіями.

*И. Жилинъ.*

**Dr. Ris. Прогрессивный параличъ и сифилисъ.** Progressive Paralyse und Syphilis Correspondenzblatt f. Schweizer Aerszte, 1907.

Вопросъ объ отношеніи прогрессивнаго паралича къ сифилису до сихъ поръ не разрѣшенъ. Авторъ задается во- просомъ: существуетъ ли гистологическое отличие между пато- логическою картиною сифилиса и прогрессивнаго паралича? Изъ его изслѣдованія вытекаетъ, что прогрессивный параличъ есть болѣзнь sui generis. Гистологическая картина мозговой коры слишвомъ характерна. Это особенная форма мозгового сифилиса. Болѣзненный процессъ—хроническое воспаление,— особенно рѣзко выдается перерожденіе сосудовъ.

*Проф. П. И. Ковалевскій.*

**Prof. Hughes. Парезъ, эпилепсія и эпилептоиды и ихъ опасность въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ.** Paresis, epelepsy and epi- leptoid os menaces to roelway safety.—The alienist and neurologist, 1908.

Лицу, ведущему желѣзнодорожный поѣздъ, ввѣряются жизни сотенъ людей и потому весьма важно, чтобы это лицо являлось безупречнымъ въ смыслѣ его физиологическихъ от- правленій, могущихъ губельно повліять на цѣлость поѣзда и сохраннос лицъ, ему ввѣренныхъ. Съ этой точки зрѣнія очень важно, что бы, между прочимъ, это лицо было свобод- но отъ эпилептическихъ и эпилептоидныхъ состояній. Даже временныя эпилептоидныя затмѣнія могли быть губельными и стоить жизни сотенъ людей.

*Проф. П. И. Ковалевскій.*

### Т е р а п і я.

**Frenkel-Heiden. Терапія спинной сухотки.** Современ кли- ника и терапія. №№ 6 и 7 1908 г

Считая основной причиной спинно-мозговой сухотки си- филисъ, авторъ, тѣмъ не менѣе, смотритъ весьма пессимисти- чески на результаты специфической терапіи. Ни предотвра-