

заболѣваніемъ при сифилисѣ. Что касается леченія, то здѣсь, наряду съ леченіемъ и душевнаго заболѣванія, авторомъ усиленно рекомендуется специальное противосифилитическое лѣченіе ртутью, іодомъ и сѣрыми ваннами, дающее во многихъ случаяхъ блестящіе результаты. *И. Баклушинскій.*

Психотерапія. 1910 г. №№ 1—2

Ю. В. Каннабихъ. Эволюція психотерапевтическихъ идей въ XIX вѣкѣ.

Н. Е. Осиповъ. О психоанализѣ

Н. А. Вырубовъ. Къ вопросу о генезѣ и леченія невроза тревоги комбинированнымъ гипно-аналитическимъ методомъ.

Г. Д. Неткачевъ. Къ психопатологіи театральной игры.

Е. В. Довбни. Случай пятилѣтней астазіи абазіи, излеченной психотерапіей.

Журналъ назначенъ исключительно для обзоренія вопросовъ психическаго леченія и прикладной психологіи. Въ первыхъ двухъ книжкахъ наряду съ новинками психотерапіи помѣщены статьи, которыя могутъ служить для ознакомленія съ этой отраслью медицины. Такъ, д-ръ *Каннабихъ* даетъ краткій историческій очеркъ психотерапіи и тутъ же излагаетъ сущность главныхъ психотерапевтическихъ принциповъ и методовъ леченія.

Самый популярный въ настоящее время психо-аналитическій методъ *Freud'a* болѣе подробно объясненъ въ статьѣ *Н. Е. Осипова* о психоанализѣ. *Freud'овскій* методъ психоанализа открываетъ въ психикѣ больныхъ и здоровыхъ людей такія эмоціональныя переживанія, которыя не достигли сознанія или инстинктивно вытѣсняются изъ него, но не могутъ совершенно исчезнуть. Эти не попавшіе въ цѣпь ассоціацій аффекты являются чѣмъ-то инороднымъ въ отношеніи остальнаго содержанія психики. Они всегда проявляются въ видѣ описовъ, оговорокъ въ рѣчи, сновидѣній, а у психопатическихъ и невропатическихъ индивидуумовъ—въ видѣ фобій и неврозовъ. Въ послѣднемъ случаѣ убѣдительное объясненіе больному способа происхожденія его болѣзни нерѣдко освобождаетъ его отъ болѣзненныхъ симптомовъ (окончаніе слѣдуетъ).

Статьи *Н. А. Вырубова*, *Г. Д. Неткачева* и *Е. В. Довбни* личными наблюденіями авторовъ иллюстрируютъ про-

исхождение различных психоневрозовъ и примѣненіе психотерапевтическихъ методовъ.  
*Н. Богатыревъ.*

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГІЯ.

Прив-доц. К. К. Скробанскій. Опытъ экспериментальной разработки вопроса о патогенезѣ эклампсін.—Журналъ акушерства и женскихъ болѣзней, 1910 г. январь.

Экспериментальныя изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ все болѣе выясняютъ значеніе плаценты въ процессѣ обмѣна веществъ между организмомъ плода и его матери и вмѣстѣ съ тѣмъ все тверже устанавливается взглядъ, по которому плацента является источникомъ ядовъ, поступленіе которыхъ въ организмъ ведетъ къ заболѣванію эклампсией, хотя выводы, къ которымъ пришли въ своихъ изслѣдованіяхъ авторы, иногда значительно расходятся въ деталяхъ. Общій недостатокъ ихъ опытовъ д-ръ Скробанскій видитъ въ томъ, что брали исключительно человѣческую плаценту для впрыскиванія животнымъ.

Поставивъ себѣ задачей—выяснить присутствіе въ плацентарной ткани веществъ, способныхъ при введеніи въ организмъ того же вида животныхъ убивать животное, авторъ произвелъ изслѣдованіе на большомъ матеріалѣ (200 кошекъ). Постановка опытовъ очень тщательная и разнообразная. Однимъ животнымъ вводились продукты человѣческой плаценты, другимъ—кошачій; плацента бралась въ разные періоды беременности; для опытовъ служили животныя обоихъ половъ. Всѣ чистые опыты, (т. е. не считая контрольных, погибшихъ отъ наркоза и т. п.) авторъ расположилъ по серіямъ. Въ первой серіи животнымъ впрыскивалась интравенозно стерильная эмульсія изъ растертой кошачей плаценты, тщательно перемѣшанной затѣмъ съ 1—2 частями 0,85% раствора NaCl и профильтрованной. Во многихъ опытахъ такая эмульсія центрифугировалась до полного осажденія взвѣшенныхъ частей черезъ нѣсколько минутъ послѣ впрыскиванія эмульсіи животныя умирали всѣ при одинаковыхъ явленіяхъ (клоническія судороги, расширеніе зрачковъ, асфиксія; при вскрытіи у всѣхъ найдено свертываніе крови). Центрифугированная эмульсія дала въ общемъ тотъ же результатъ, кромѣ трехъ кошекъ, изъ которыхъ двѣ прожили 1—1½ часа, а одна—3 дня. Полъ животныхъ, срокъ беременности, въ кото-