

ной системы. Она обнаруживается смѣной періодовъ угнетенія психической дѣятельности періодами ускоренія ея и лучшаго настроенія. Обнаружившись иногда въ дѣтствѣ, циклотимія идетъ и протекаетъ роковымъ образомъ; она даетъ чувствовать себя въ теченіе всей жизни индивидуума. Если періоды заторможенія и ускоренія психической дѣятельности не выходятъ по своимъ проявленіямъ изъ извѣстныхъ границъ, то говорятъ о неврастеніи или считаютъ такого человѣка здоровымъ, а болѣе рѣзкія проявленія циклотимической конституціи обыкновенно диагностируются, какъ манія или меланхолія. Авторъ считаетъ циклотимію слабо выраженной формой маниакально-депрессивнаго психоза. *Н. Богатыревъ.*

I. Morgeira. Душевные заболѣванія у лепрозныхъ больныхъ. Geistesstörung bei Leprakranken.—Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie LXVII, S. 293 (1910 г.).

Авторъ описываетъ 9 случаевъ, въ которыхъ у лепрозныхъ больныхъ наблюдалось развитіе различныхъ душевныхъ заболѣваній. На основаніи личныхъ наблюденій и литературныхъ данныхъ Morgeira дѣлаетъ слѣдующіе выводы.

1) Ни одна изъ формъ душевныхъ заболѣваній не является характерной для проказы. Однако Polyneuritis leprosa можетъ сопровождаться развитіемъ Корсаковского синдрома. 2) Одновременно съ развитіемъ лерга наблюдались, правда не часто, почти всѣ формы психозовъ. 3) Туберкулезъ, инфекция стрептококками и другія осложненія проказы могутъ повлечь за собой развитіе душевнаго заболѣванія у лепрозныхъ больныхъ. 4) Обычное состояніе духа (gewöhnliche geisteszustand) у лепрозныхъ больныхъ различно и находится въ зависимости, какъ отъ наследственности и воспитанія, такъ и отъ клинической формы заболѣванія. *В. Дикшицкий.*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГІЯ.

А. И. Ющенко. Кататонически-подобные симптомы у собакъ, лишенныхъ щитовидной железы. Къ физиологіи щитовидной железы.—Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и экспериментальной психологіи. 1910 г. № 2.

Послѣ полной тиреоидектоміи у собакъ авторъ наблюдалъ ригидность въ мышцахъ, дрожь; простыя и болѣе слож-

ныя однообразныя движенія, слюнотеченіе, пониженіе температуры; далѣе—пассивное отношеніе ко всему окружающему, вялость и нѣкот. другія явленія. Моча и сыворотка таковыхъ животныхъ болѣе ядовиты, чѣмъ у нормальныхъ; окислительныя функціи крови понижены. Молочная діета и очищеніе пищевака временно улучшаетъ состояніе животныхъ, лишенныхъ щитовидной железы, но всѣ они вообще скоро погибаютъ отъ судорожныхъ припадковъ при явленіяхъ интоксикаціи и психической подавленности.

Н. Богатыревъ.

П С И Х О Л О Г І Я.

Л. М. Розенштейнъ. Экспериментальное изслѣдованіе способности къ запоминанію у алкоголиковъ.—Журналъ невропатологии и психіатріи имени С. С. Корсакова. 1910 г. кн. 1.

Способность запоминанія у алкоголиковъ при массовыхъ опытахъ по методу Бернштейна—Нечаева оказывается замѣтно слабѣе чѣмъ у нелюбителей. У лицъ выпившихъ въ день изслѣдованія, она еще болѣе понижается, приблизительно соразмѣрно съ количествомъ выпитаго алкоголя.

Н. Богатыревъ.

И. Е. Петерсенъ. Методъ Heilbronner'a и его значеніе.—Журналъ невропатологии и психіатріи имени С. С. Корсакова. 1910 г. кн. 1.

Методъ Heilbronner'a состоитъ въ слѣдующемъ: изслѣдуемому предлагаютъ рассмотреть схематическій рисунокъ б.-н. общеизвѣстнаго предмета и затѣмъ сказать, что изображаетъ этотъ рисунокъ. Въ слѣдующихъ рисункахъ постепенно вводятся детали. По точности и быстротѣ, съ какой объясняется значеніе рисунка и замѣчаются новыя детали, можно судить о способности воспринимать существенныя особенности даннаго предмета (Merkfähigkeit Wernicke) Д-ръ Петерсенъ изслѣдовалъ воспримчивость у душевно-больныхъ по методу Heilbronner'a и находитъ, что этотъ методъ имѣетъ преимущество предъ методомъ Бернштейна и его модификаціями, такъ какъ помимо точностей результатовъ онъ даетъ ясную картину ассоціативной рѣзультатовъ онъ даетъ ясную картину ассоціативной дѣятельности у б—хъ и указываетъ на состояніе дементности.

Н. Богатыревъ.