ныя однообразныя движенія, слюнотеченіе, пониженіе температуры; далѣе—пассивное отношеніе ко всему окружающему, вялость и нѣкот. другія явленія. Моча и сыворотка такихъ животныхъ болѣе ядовиты, чѣмъ у нормальныхъ; окислительныя функціи крови понижены. Молочная діэта и очищеніе кишечника временно улучшаетъ состояніе животныхъ, лишенныхъ щитовидной железы, но всѣ они вообще скоро погибаютъ отъ судорожныхъ припадковъ при явленіяхъ интоксикаціи и психической подавленности. *Н. Богатыревъ.*

ПСИХОЛОГІЯ.

Л. М. Розенштейнъ. Экспериментальное изслѣдованіе способности къ запоминанію у алкоголиковъ.—Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. 1910 г. кн. 1.

Способность запоминанія у алкоголиковъ при массовыхъ опытахъ по методу Бернштейна—Нечаева оказывается замѣтно слабѣе чѣмъ у непьющихъ. У лицъ выпившихъ въ день изслѣдованія, она еще болѣе понижается, приблизительно соразмѣрно съ количествомъ выпитаго алкоголя.

Н. Богатыревъ.

И. К. Петерсенъ. Методъ Heilbronner'a и его значеніе.—Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. 1910 г. кн. 1.

Методъ Heilbronner'a состоитъ въ слѣдующемъ: изслѣдуемому предлагаютъ разсмотрѣть схематическій рисунокъ к.-н. общеизвѣстнаго предмета и затѣмъ сказать, что изображаетъ этотъ рисунокъ. Въ слѣдующихъ рисункахъ постепенно вводятся детали. По точности и быстротѣ, съ какой объясняется значеніе рисунка и замѣчаются новыя детали, можно судить о способности воспринимать существенныя особенности даннаго предмета (Merkfähigkeit Wernicke) Д-ръ *Петерсенъ* изслѣдовалъ воспріимчивость у душевно-больныхъ по методу Heilbronner'a и находитъ, что этотъ методъ имѣетъ преимущество предъ методомъ Бернштейна и его модификаціями, такъ какъ помимо точностей результатовъ онъ даетъ ясную картину ассоціативной дѣятельности у б—хъ и указываетъ на состояніе дементности. *Н. Богатыревъ.*