

мизма у эпилептиковъ, принимавшихъ въ теченіе долгаго времени большія количества брома и придерживавшихся режима, содержащаго малыя количества повареной соли, давалъ небольшія дозы послѣдней (2,0 grо die); явленія бромизма исчезали черезъ нѣсколько дней. Въ случаяхъ упорнаго аспе бромистаго происхожденія авторъ съ успѣхомъ назначалъ компрессы изъ 10% раствора хлористаго натра.

Прибавленіе въ пищу повареной соли авторъ рекомендуетъ только при наличности симптомовъ бромизма, въ остальныхъ же случаяхъ эпилепсіи онъ совѣтуетъ насколько возможно уменьшать количество вводимаго въ организмъ хлористаго натра, такъ какъ послѣдній дѣйствуетъ на эпилептиковъ возбуждающимъ образомъ, способствуя повторенію припадковъ. Въ 12 случаяхъ идиопатической Jackson'овской эпилепсіи припадки, исчезнувшіе послѣ приемовъ брома, вновь появились, какъ только больнымъ въ теченіе ряда дней стали давать 20,0—30,0 grо die хлористаго натра.

В. Дикшицкій.

ФИЗИО-ТЕРАПІЯ.

С. А. Вруштейнъ. Къ вопросу о леченіи невралгій ультрафіолетовыми лучами.—Врачебная газета 1910 г. № 15.

Для леченія невралгій д-ръ *Вруштейнъ* примѣнялъ свѣтъ ртутно-кварцевой лампы проф. Кромayer'a. Изъ 57 случаевъ выздоровленіе достигнуто въ 43, значительное улучшеніе—въ 11 и только въ 3 случаяхъ не получило улучшенія. Количество сеансовъ, потребное для превращенія болей, колебалось отъ 1 до 10, продолжительность **каждаго** сеанса—отъ 1 до нѣсколько минутъ; лучи направлялись съ разстоянія 5—7 смтм. отъ кварцеваго окошечка лампы, преимущественно на болящія точки рѣже—лабильно по ходу нерва. Сеансы повторялись черезъ —3—4 дня. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ боли уменьшались непосредственно послѣ сеанса, а большею частью—спустя 24—30 часовъ. Авторъ совѣтуетъ примѣнять ультрафіолетовые лучи во всѣхъ случаяхъ невралгій, независимо отъ ихъ причины, интенсивности и продолжительности.

Н. Богатыревъ.

