

П С И Х И А Т Р И Я .

Е. Л. Ключева. Стафилококцемія, какъ причина психическаго заболѣванія.—Русскій Врачъ, 1910, № 32.

Описываемый случай остраго душевнаго заболѣванія подтверждаетъ опредѣлившийся въ послѣднее время взглядъ большинства психіатровъ на причины душевныхъ разстройствъ, какъ на результатъ отравленій и самоотравленій организма и въ частности центральной нервной системы. У больной съ тяжелой наслѣдственностью остро развитое душевное заболѣваніе съ признаками аmentia. При развитіи болѣзни обращало вниманіе то обстоятельство, что возбужденное состояніе больной совпадало съ исчезновеніемъ у нея t⁰ и наружныхъ признаковъ стафилококковой инфекціи, въ видѣ парныхъ, петехій, остеомиелита и т. п. и, наоборотъ, при появленіи этихъ признаковъ, улучшилась психика больной. При микроскопическомъ и бактериологическомъ изслѣдованіи крови были найдены стафилококки (st. aebus). На основаніи этого авторъ приходитъ къ выводу, что въ данномъ случаѣ причиною заболѣванія послужила стафилококковая инфекция, которая благодаря тяжелой наслѣдственной конституціи у больной отразилась именно на центральной нервной системѣ, которая, въ данномъ случаѣ представляла locus minoris resistentiae для яда.

И. Баклушинскій.

Н. А. Юрманъ. Случай психоза на почвѣ отравленія клоачными газами.—Русск. Врачъ, 1910 г. № 16.

Приводится описаніе заболѣванія подъ вліяніемъ вдыханія газовъ во время пребыванія въ ямѣ Chambot, съ преобладаніемъ явленій со стороны нервно-психической сферы. Послѣ бессознательнаго состоянія наступило у больного крайнее угнетеніе, при невозможности ходить безъ посторонней помощи. Послѣднее, вѣроятно, результатъ паралитическихъ явленій. Въ данномъ случаѣ заболѣваніе авторъ объясняетъ отравленіемъ угольнымъ газомъ въ связи съ другими газами (амміакъ и др.).

И. Баклушинскій.

Arndt. Гликозурия при алкогольномъ бредѣ. Ueber die Glycosurie der Alkoholdeliranten.—Monatsch. für Psych. und Neurol. Bd. XXVII, S. 222 (1910 г.).

Авторъ производилъ въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени изслѣдованіе мочи на сахаръ у 194 алкоголиковъ. Всѣхъ своихъ больныхъ онъ раздѣлилъ на 3 группы; къ первой онъ отнесъ 99 случаевъ *delirium potatorium*; ко 2-й—26 случаевъ *delirium potatorium abortivum*, въ которыхъ бредовыя явленія были выражены въ слабой степени, и наконецъ къ 3-й—69 случаевъ *alcoholismus chronicus* безъ бреда.

Присутствіе сахара въ мочѣ было констатировано въ 30^{0/0} случаевъ 1-й группы—*delirium potatorium*, въ 14^{0/0}—*delirium potatorium abortivum* и въ 30,4^{0/0} случаевъ 3-й группы—*alcoholismus chronicus*.

Анализируя полученные имъ данныя, авторъ отмѣчаетъ, что при алкогольномъ бредѣ глюкозурия не всегда является „послѣбредовой“ (*postdeliriöse Glykosurie*), какъ это утверждаетъ *Kaimann*. Такъ, у $\frac{2}{3}$ больныхъ, относящихся къ 1-й группѣ, присутствіе сахара было обнаружено еще за нѣкоторое время до наступленія кризиса.

Количество сахара колебалось между 0,2^{0/0} и 0,4^{0/0}, только въ 4 случаяхъ было болѣе 0,5^{0/0}. *В. Лихницкій.*

Morgenthaler. Измѣренія кровяного давленія у душевнобольныхъ. *Blutdruckmessungen an geisteskranken.*—*Allgemeine Zeitschr. für Psych.* LXVII, 2 (1910 г.).

Свои наблюденія авторъ производилъ въ психіатрической больницѣ въ Waldau, гдѣ имъ было сдѣлано болѣе 2,400 измѣреній кровяного давленія. Къ статьѣ приложено 23 кривыхъ, наглядно резюмирующихъ цифровыя данныя, относящіяся къ болѣе интереснымъ случаямъ.

На основаніи имѣвшагося въ его распоряженіи матеріала, авторъ дѣлаетъ слѣдующіе выводы:

1) Аппаратъ Riva-Rocci, видоизмѣненный Sahli, удовлетворяетъ своему назначенію, но имѣетъ нѣкоторые недостатки, особенно рѣзко дающіе себя знать при психологическихъ опытахъ. Къ числу такихъ недостатковъ относятся невозможность непосредственно измѣрять и регистрировать колебанія кровяного давленія; передъ каждымъ измѣреніемъ приходится нагнетать воздухъ до тѣхъ поръ, пока не исчезнетъ пульсація *arter. radialis*, а затѣмъ ожидать ея появленія вновь. Благо-