

**L. Bruns.** Распознавание и лечение опухолей головного мозга.—Современная клиника и терапия № 3 и 4, 1910 г.

Въ лечении опухолей мозга особенно важно правильное установление дифференц. и мѣстнаго діагноза опухоли. Авторъ особенно подробно останавливается на діагностическихъ признакахъ опухолей различныхъ частей мозга. Мѣстный диагнозъ можетъ быть иногда поставленъ съ абсолютною вѣрностью, напр. при опухоляхъ въ центральныхъ извилинахъ, въ средней и задней черепной ямкѣ и въ мосту, иногда же онъ бываетъ невозможенъ, напр. при опухоляхъ въ правой височной области или лобной (правой) долѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ діагностику выясняетъ пробный проколъ по *Neisser-Follak*'у. Важно для леченія выясненіе свойства опухоли, но въ сожалѣнію клиническія картины рѣдко даютъ основаніе для этого. Лечение можетъ быть только хирургическое. Даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ почему-либо нельзя провести вылуценіе опухоли, то одна только трепанация черепа, соединенная съ истеченіемъ черепно-спинной жидкости, спасаетъ больного отъ невыносимыхъ головныхъ болей, рвоты и устраняетъ (временно) опасность слѣпоты. Трепанация, значитъ, показана и въ случаяхъ съ невыясненнымъ мѣстнымъ диагнозомъ, когда общіе симптомы становятся стаціонарными, когда головная боль достигаетъ невыносимой степени, падаетъ острота зрѣнія и грозитъ опасность атрофіи зрительнаго нерва. Временнаго благоприятнаго результата можно достигнуть и поясничнымъ проколомъ. Внутренняя терапия играетъ незначительную роль, это ртуть и іодъ при сифилисѣ, а также іодное леченіе при саркомахъ и гліомахъ. Но эта терапия ведетъ развѣ только въ облегченію страданій больного.

*И. Баклушинскій.*

#### Д И А Г Н О С Т И К А.

**Kafka.** Техника и значеніе цитологическаго изслѣдованія черепно-мозговой жидкости. Ueber Technik und Bedeutung der cytologischen Untersuchung des Liquor cerebrospinalis.—Monatschrift für Psych. und Neurol. XXVII, 414 (1910 г.).

Наиболѣе точные результаты при опредѣленіи числа