

Janet, Pitres и другіе проводятъ идею о самостоятельной формѣ душевнаго разстройства—*психастеніи*, которая представляетъ собою симптомокомплексъ различныхъ фобій, насильственныхъ явленій, тревожнаго душевнаго состоянія и проч. Авторъ держится прежнихъ воззрѣній, что это есть не больше, какъ нейрастенія, осложненная различными душевными разстройствами, какъ сомнѣніе, утомленіе, слабость интеллекта и проч., на дегенеративной почвѣ. Тѣмъ не менѣе онъ допускаетъ формулу Janet, что напряженность душевныхъ разстройствъ стоитъ въ прямомъ соотношеніи съ пониженіемъ нервнаго тонуса, въ силу закона, что состояніе нервной депрессіи усиливаетъ всѣ аномалійныя или патологическія склонности.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Dupré et Charpentier. Отравители. Les empoisonneurs. Revue neurologique, 1908.

Въ послѣднее время усиленно изучается психологія различныхъ разновидностей преступниковъ, какъ: отцеубійцы, дѣтоубійцы и проч. Авторы обратили вниманіе на психологію отравителей. По статистическимъ даннымъ оказывается, что отравленіе производится въ семи изъ десяти случаевъ женщинами. Это преступленіе болѣе свойственно характеру женщинъ и поэтому мужчины отравители, по всему вѣроятію, должны имѣть въ своемъ характерѣ нѣчто женподобное. Наблюденія авторовъ вполне это подтверждаютъ. Въ характерѣ такихъ людей усматриваются: умственная неуравновѣшенность, аффективная и нравственная нечувствительность, миеоманія (лживость, симуляція и скрытность, миметизмъ и фабуляція), инстинктивныя разстройства (тщеславіе, хитрость, алчность, порочность и проч.). Общій выводъ тотъ, что во всѣхъ случаяхъ преступныхъ отравленій должно производить экспертизу душевнаго состоянія преступниковъ.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Хирургія нервной системы.

Е. П. Конику. Къ вопросу о резекціи шейнаго симпатическаго нерва при Вазедовой болѣзни. Диссертация. Юрьевъ. 1908 г.

Въ названной работѣ авторъ даетъ литературу вопроса (185 работъ), изучая всесторонне исторію ученій о сущности

Базедовой болѣзни.

II глава посвящена статистикѣ операцій на шейномъ симпатическомъ нервѣ; рассмотрѣны три вида операціи: перерѣзка нерва, частичная резекція нерва и полная резекція шейнаго симпатическаго нерва со всѣми тремя узлами и даже съ верхнимъ груднымъ. Результаты операцій различныхъ авторовъ по всѣмъ тремъ способамъ сведены авторомъ въ одну таблицу (стр. 112). Относительно пучеглазія резекція даетъ вдвое лучшіе результаты, чѣмъ симпатикотомія. Уменьшеніе (resp) исчезновеніе пучеглазія до 90⁰/₀. Безъ перемѣны зобъ остается въ 26⁰/₀, одинаково при всѣхъ способахъ, исчезновеніе въ 10—16⁰/₀ уменьшеніе 50—67⁰/₀. То же приблизительно и относительно тахикардіи. Даже полная резекція даетъ въ 26⁰/₀—status quo ante. Вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ не даетъ ни одна операція.

Въ III главѣ собрано 8 клинич. исторій болѣзни базедовиковъ, оперированныхъ проф. Вече фонъ Мантейфелемъ: 2 случая только симпатикотоміи и 6 случаевъ симпатикотоміи съ частичной резекціей зоба. Выводы автора сводятся къ признанію благопріятнаго вліянія симпатикотоміи на пучеглазіе, что онъ объясняетъ ослабленіемъ сокращенія орбитальныхъ мышцъ, инвервируемыхъ симпатическимъ нервомъ.

Симпатикотомія и резекція всѣхъ трехъ шейныхъ узловъ одинаково вліяютъ на пучеглазіе. Вліяніе резекціи нерва на зобъ сомнительно такъ же, какъ на другіе симптомы Базедовой болѣзни, которые, по автору, зависятъ отъ состоянія зоба. Признавая резекцію только верхняго узла безопасной, авторъ считаетъ болѣе обширную резекцію нерва не менѣе опасной, чѣмъ резекцію зоба; соединеніе обѣихъ этихъ операцій: резекцію зоба и верхняго узла, авторъ считаетъ дающими самый лучшій и скорый результатъ. *А. Шоломовичъ.*

Физиотерапія.

Dr. Herzog.—Zur Behandlung der tabischen Ataxie. Къ лѣченію табетической атаксіи. Deutsch. med. Wochenschrift. № 38. 1909.

Авторъ приводитъ четыре случая tabes'a съ рѣзко выраженной атаксіей и расстройствами пузыря, успѣшно пользо-