

Souques. Vitiligo et signe d'Argyll-Robertson d'origine syphilitique (Revue neurolog. 1902 г. № 6).

Авторъ описываетъ случай vitiligo съ симптомомъ Аргиль-Робертсона сифилитическаго происхожденія аналогично наблюденіямъ Ballet и Bauer'a, которые недавно показали въ Парижскомъ неврологическомъ Обществѣ двухъ больныхъ, страдающихъ vitiligo et tabes. Дѣло идетъ о 69 лѣтн. мужчинѣ, представлявшемъ 3 слѣдующіе симптома: 1) парезъ лѣвой вокальной связки съ битональнымъ голосомъ, 2) симптомъ Аргиль-Робертсона съ обоюдостороннимъ мѣозомъ, 3) кожная дисхромія съ 15 лѣтн. возраста. Граница кожной аномалии занимаетъ нижнюю часть туловища и захватываетъ бедра и ягодицы; начинается на 4 попер. пальца отъ сосковъ внизу, сзади доходитъ до ягодичной борозды, а спереди захватываетъ верхнюю часть бедеръ совершенно симметрично. На островкахъ гипохроміи находятся вѣсколько пятенъ гиперхроміи. Кожа половыхъ органовъ пигментировала, отечна, представляетъ видъ elephantiasis'a. Во время поступленія у больного было два серпигинозныхъ сифилида, исчезнувшихъ послѣ ртутныхъ вырыскиваній; субъектъ не помнитъ сифилиса, но боли въ горлѣ были. Никакихъ другихъ симптомовъ двигательныхъ и чувствительныхъ нѣтъ. Больного назвать табетикомъ нельзя; можетъ быть кандидатомъ въ виду симптома Argyll-Robertson'a, хотя Babinski наблюдалъ у одного неврастеника потерю свѣтоваго рефлекса безъ какихъ-либо признаковъ tabes. Симметричное распредѣленіе дисхроміи обязано нервной системѣ; оно сифилитическаго происхожденія; скорѣе псевдо-витилиго, какъ въ случаяхъ Scherb'a. Симptomъ Argyll'я и дисхромія обязаны одной причинѣ: сифилису нервныхъ центровъ, и это не есть vitiligo табетиковъ, а только совмѣстное существованіе. Авторъ высказываетъ гипотезу, что tabes и vitiligo могутъ имѣть общую этиологію—сифились.

*В. И. Рудневъ.*

*Marie et Guillain.* Vitiligo avec symptômes tabétiques (Rev. neurol. 1902. г. № 6).

Послѣ сообщеній Ballet и Bauer'a М. и G. изслѣдовали 6 больныхъ vitiligo и при этомъ оказалось: отсутствіе сифи-