

*M. Laehr.* Ueber Störungen der Schmerz und Temperaturempfindung in Folge von Erkrankungen des Rückenmarkes.—Archiv. f. Psychiatrie, Bd XXVIII, Heft. 3.

Въ весьма обширной работѣ, на основаніи наблюденій другихъ авторовъ и одиннадцати собственныхъ случаевъ, Laehr приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. При сирингоміэліи, такъ же какъ и при другихъ центральныхъ заболѣваніяхъ спинного мозга, распространеніе разстройствъ кожной чувствительности носитъ опредѣленный характеръ. Эти пораженія чувствительности похожи на тѣ, которыя обусловлены пораженіями заднихъ корешковъ или поперечными разрѣзами спинного мозга. Анатомическая причина разстройствъ кожной чувствительности—это разрушеніе задняго сѣраго вещества на соотвѣтствующемъ уровнѣ спинного мозга.

На основаніи клиническихъ и патологоанатомическихъ данныхъ слѣдуетъ заключить, что у людей пути для температурныхъ ощущеній и для чувствованій боли заключены въ заднихъ рогахъ той же стороны, выше они перекрещиваются въ сѣромъ веществѣ и наконецъ его оставляютъ; по всей вѣроятности они входятъ въ боковые столбы.

При центральной гематоміэліи обычно разрушено только сѣрое вещество, но при этомъ отчасти можетъ быть разрушено и бѣлое. Это пораженіе клинически выражается сегментнымъ гнѣзднымъ заболѣваніемъ, сходнымъ съ сирингоміэліей; въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно представляетъ соединеніе сирингоміэліи съ Brown-Séguard'овскимъ параличемъ. Тщательное опредѣленіе распространенія частичныхъ разстройствъ чувствительности очень важно для дифференціального діагноза между сирингоміэліей, истеріей и лепрой.

*В. Ч.*

*A. Cramer.* Ueber Sinnestauschungen bei geisteskranken Taubstummen.—Archiv f. Psychiatrie, Bd. XXVIII, Heft 3.

Въ виду недостаточной изслѣдованности этого весьма важнаго вопроса, работа автора представляетъ значительный интересъ, хотя она и состоитъ изъ описанія одного хорошо изученнаго случая и краткой замѣтки о другомъ. Cramer утверждаетъ, что при врожденной глухонѣмотѣ высшее умственное развитіе можетъ быть достигнуто при отсутствіи звуковыхъ образовъ словъ. Громадное значеніе этихъ образовъ доказывается случаемъ больного, пораженнаго глухонѣ-