

*M. Laehr.* Ueber Störungen der Schmerz und Temperaturempfindung in Folge von Erkrankungen des Rückenmarkes.—Archiv. f. Psychiatrie, Bd XXVIII, Heft. 3.

Въ весьма обширной работѣ, на основаніи наблюденій другихъ авторовъ и одиннадцати собственныхъ случаевъ, Laehr приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. При сирингоміэліи, такъ же какъ и при другихъ центральныхъ заболѣваніяхъ спинного мозга, распространеніе разстройствъ кожной чувствительности носитъ опредѣленный характеръ. Эти пораженія чувствительности похожи на тѣ, которыя обусловлены пораженіями заднихъ корешковъ или поперечными разрѣзами спинного мозга. Анатомическая причина разстройствъ кожной чувствительности—это разрушеніе задняго сѣраго вещества на соотвѣтствующемъ уровнѣ спинного мозга.

На основаніи клиническихъ и патологоанатомическихъ данныхъ слѣдуетъ заключить, что у людей пути для температурныхъ ощущеній и для чувствованій боли заключены въ заднихъ рогахъ той же стороны, выше они перекрещиваются въ сѣромъ веществѣ и наконецъ его оставляютъ; по всей вѣроятности они входятъ въ боковые столбы.

При центральной гематоміэліи обычно разрушено только сѣрое вещество, но при этомъ отчасти можетъ быть разрушено и бѣлое. Это пораженіе клинически выражается сегментнымъ гнѣзднымъ заболѣваніемъ, сходнымъ съ сирингоміэліей; въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно представляетъ соединеніе сирингоміэліи съ Brown-Séguard'овскимъ параличемъ. Тщательное опредѣленіе распространенія частичныхъ разстройствъ чувствительности очень важно для дифференціального діагноза между сирингоміэліей, истеріей и лепрой.

*В. Ч.*

*A. Cramer.* Ueber Sinnestauschungen bei geisteskranken Taubstummen.—Archiv f. Psychiatrie, Bd. XXVIII, Heft 3.

Въ виду недостаточной изслѣдованности этого весьма важнаго вопроса, работа автора представляетъ значительный интересъ, хотя она и состоитъ изъ описанія одного хорошо изученнаго случая и краткой замѣтки о другомъ. Cramer утверждаетъ, что при врожденной глухонѣмотѣ высшее умственное развитіе можетъ быть достигнуто при отсутствіи звуковыхъ образовъ словъ. Громадное значеніе этихъ образовъ доказывается случаемъ больного, пораженнаго глухонѣ-

мотой на десятомъ году жизни и тѣмъ не менѣе, много лѣтъ спустя, имѣвшаго слуховыя галлюцинаціи, въ которыхъ играли роль звуковые образы словъ. У глухонѣмыхъ отъ рожденія галлюцинаціи замѣнены мыслями въ слухъ (*Gedenkenlautwerden*), причемъ звуковые образы словъ не играютъ никакой роли. Какъ у нормальныхъ людей мышленіе словами развито неодинаково, такъ и у душевно-больныхъ мышленіе въ слухъ зависитъ отъ разной степени ненормальностей въ образованіи двигательныхъ словесныхъ представленій. Мышленіе въ слухъ происходитъ совершенно или почти совершенно безъ участія акустическихъ элементовъ. Галлюцинаціи слуха чисто акустическаго характера состоятъ въ воспріятіи отдѣльныхъ словъ.

В. Ч.

*L. Bruns.* Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Chirurgie der Rückenmarkstumoren. Archiv f. Psychiatrie, Bd. XXVIII, Heft. 1.

На основаніи двухъ собственныхъ наблюденій съ послѣдовательнымъ патолого-анатомическимъ изслѣдованіемъ и критическаго разбора литературы предмета, авторъ приходитъ къ заключенію, что въ трети случаевъ опухолей спинного мозга операція можетъ повести къ излеченію. Необходимое для успѣха точное распознаваніе мѣста опухоли возможно гораздо чаще, чѣмъ это еще недавно принято было думать. Для того, чтобы имѣть возможность поставить точный діагнозъ, не нужно спѣшить; гораздо лучше выждать, пока процессъ не выяснится вполне. Однако при самомъ точномъ діагнозѣ при операціи или при вскрытіи послѣ неудачнаго исхода операціи могутъ оказаться обстоятельства, которыхъ нельзя было предполагать и которыя обуславливаютъ смертельный исходъ. Поэтому въ случаяхъ оперативнаго удаленія опухолей спинного мозга необходима крайняя осторожность въ предсказаніи. Работа снабжена двумя таблицами прекрасныхъ рисунковъ.

В. Ч.

*E. Hallerworden.* Ueber anämische Sprachstörung. — Archiv f. Psychiatrie, Bd. Heft. I.

Авторъ приводитъ три исторіи болѣзни, доказывающія что одна анэмія мозга можетъ быть причиной анартрическихъ и афазическихъ разстройствъ рѣчи; афазія вслѣдствіе анэмии