мотой на десятомъ году жизни и тѣмъ не менѣе, много лѣтъ спустя, имѣвшаго слуховыя галлюцинаціи, въ которыхъ играли роль звуковые образы словъ. У глухонѣмыхъ отъ рожденія галлюцинаціи замѣнены мыслями въ слухъ (Gedenkenlautwerden), причемъ звуковые образы словъ не играютъ никакой роли. Какъ у нормальныхъ людей мышленіе словами развито неодинаково, такъ и у душевно-больныхъ мышленіе въ слухъ зависитъ отъ разной степени ненормальностей въ образованіи двигательныхъ словесныхъ представленій. Мышленіе въ слухъ происходитъ совершенно или почти совершенно безъ участія акустическихъ элементовъ. Галлюцинаціи слуха чисто акустическаго характера состоятъ въ воспріятіи отдѣльныхъ словъ.

B, Y

L. Bruns. Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Chirurgie der Rückenmarkstumoren. Archiv f. Psychiatrie, Bd. XXVIII, Heft. 1.

На основаніи двухъ собственныхъ наблюденій съ послівдовательнымъ патолого-анатомическимъ изследованіемъ и критическаго разбора литературы предмета, авторъ приходитъ къ заключенію, что въ трети случаевъ опухолей спинного мозга операція можеть повести къ излеченію. Необходимое для успъха точное распознавание мъста опуходи возможно гораздо чаще, чъмъ это еще недавно принято было думать. Для того, чтобы имъть возможность поставить точный ліагнозъ, не нужно спъшить; гораздо лучше выждать, пока процессъ не выяснится вполнъ. Однако при самомъ точномъ діагнозъ при операціи или при вскрытіи послѣ неудачнаго исхода операціи могуть оказаться обстоятельства, которыхъ нельзя было предполагать и которыя обусловливають смертельный исхоль. Поэтому въ случаяхъ оперативнаго удаленія опухолей спинного мозга необходима крайняя осторожность въ предсказаніи. Работа снабжена двумя таблицами прекрасныхъ рисунковъ.

В. Ч.

E. Hallerworden. Ueber anämische Sprachstörung. — Archiv f. Psychiatrie, Bd. Heft. I.

Авторъ приводитъ три исторіи болѣзни, доказывающія что одна анэмія мозга можетъ быть причиной анартрическихъ и афазическихъ разстройствъ рѣчи; афазія вслѣдствіе анэміи