

денный преступник“, симулировавший фетишизм для выманивания денег и для того, чтобы избѣгнуть наказанія.

Я думаю, что мы должны быть благодарны Kurella, какъ первому изъ германскихъ психіатровъ, прямо высказавшему, что дѣйствительно есть преступники—люди ненормальные, но тѣмъ не менѣе не душевно-больные; нужно надѣяться, что и другіе психіатры въ своихъ заключеніяхъ у судебныхъ слѣдователей и въ судѣ послѣдуютъ примѣру Kurella, справедливо рассуждающему, что выводъ изъ такой экспертизы, какъ и изъ всякой, подлежитъ сдѣлать суду.

В. Ч.

Ferrari. Психическія расстройства въ сочетаніи съ множественнымъ невритомъ. (Cerebropathia psychica toxae mica Корсакова, Polyneuritis Psychosis другихъ авторовъ).—The Alienist and Neurologist, January 1896, № 1.

Подъ именемъ Polyneuritis psychosis Корсаковъ описалъ болѣзнь, отличающуюся отъ типичнаго полиневрита преобладаніемъ расстройствъ со стороны психической сферы. Начинается она соматическими симптомами—рвотой, затрудненной походкой, болями и мышечной атрофіей; электровозбудимость мышцъ пропадаетъ, являются контрактуры; колѣнный рефлексъ рано исчезаетъ, другіе остаются нормальными или даже повышенными. Смерть наступаетъ отъ паралича дыхательныхъ мышцъ. Что касается психическихъ расстройствъ, то послѣднія проявляются въ началѣ болѣзни въ видѣ простой раздражительности, впоследствии же на первый планъ выступаетъ amnesia. Послѣдняя развивается медленно, но, разъ развившись, обыкновенно весьма рѣзко выражена и удерживается долгое время. Иногда замѣчаютъ расстройства со стороны головного и спинного мозга: нарушеніе рѣчи, глотанія, nystagmus, наружная офтальмоплегія. Больной на первый взглядъ кажется вполне нормальнымъ: разумно рассуждаетъ, даже съ одушевленіемъ, но весьма быстро забываетъ, что случилось за моментъ передъ разговоромъ. Понятія о времени и мѣстѣ отсутствуютъ; при извѣстномъ напряженіи силы воли можетъ даже обнаружиться нѣкоторая память, но не надолго.

Что касается анатомическихъ основъ описываемой болѣзни, то въ одномъ случаѣ Gies'a и Pagenstecher'a найдены были капиллярныя кровоизліянія въ головномъ мозгу; авторъ

однако не придастъ имъ значенія, такъ какъ больной былъ эпилептикъ. Въ продолговатомъ мозгу были находимы вакуолы въ нервныхъ клѣткахъ, въ периферическихъ нервахъ частичный (Segmentary) невритъ по типу Gombault, въ мышцахъ—перерожденіе волоконъ. Въ случаѣ Корсакова и Сербскаго въ продолговатомъ мозгу было констатировано въ столбахъ Голля и боковыхъ разсѣянное разрастаніе невроглии.—Этіологія болѣзни такая же, какъ и множественнаго неврита; причины ея — интоксикаціи (свинець, мышьякъ, алкоголь) и токсемія, обусловленная особымъ ядомъ (неизвѣстной химической природы), выдѣляемымъ, вѣроятно, микроорганизмами. Дифференціальный діагнозъ долженъ имѣть въ виду истерію, полиомѣлитъ и острый восходящій параличъ. Прогнозъ обыкновенно благопріятенъ и зависитъ въ общемъ отъ интенсивности общихъ симптомовъ. Лечение—профилактическое и симптоматическое.

Анализируя описанную картину, авторъ останавливается на амнезіи, какъ формѣ, признанной авторами характерной для polyneuritis psychosis. Но амнезія встрѣчается и при другихъ страданіяхъ: 1) при множественномъ невритѣ на почвѣ алкоголизма; 2) при множественномъ невритѣ, вызванномъ иными моментами, 3) при алкоголизмѣ, не сопровождающемся нервными расстройствами, 4) въ тѣхъ случаяхъ, когда существуютъ всѣ этиологическіе моменты множ. неврита, но послѣдній отсутствуетъ вовсе и 5) послѣ остраго психоза. Въ виду этого мы не можемъ амнезію относить ни къ множ. невриту, ни къ алкоголизму, такъ какъ ея нѣтъ при наличности названныхъ условий. Вообще психич. расстройства, сопровождающія полиневритъ, слишкомъ скоропреходящи, чтобы принимать ихъ за послѣдствія множественнаго неврита, такъ что правильнѣе было бы разсматривать психическія расстройства, сопутствующія полиневриту, за явленія случайныя. Нераціонально поэтому, въ виду крайне незначительнаго числа наблюденій, создавать новую болѣзнь.

Г. X.

Harriet C. B. Alexander.—Abuse of bromides.—The Alienist and Neurologist, 1896, № 3.

Авторъ собралъ важнѣйшія наблюденія, касающіяся побочнаго дѣйствія бромистыхъ препаратовъ, употребляемыхъ въ большихъ дозахъ. Чаще всего поражается кожа (дерматозы), затѣмъ — органъ зрѣнія (конъ-