

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

*Рефераты по психіатріи и невропатологіи.*

*John Turner.* Statistics dealing with Hereditary Insanity, based on upwards of a Thousand Cases occurring in the Essex County Asylum. (The journal of mental science. 1896, № 142).

Статистики американскихъ психіатрическихъ лечебницъ (Пенсильваніи, Нью-Йорка) показываютъ, что наслѣдственными душевными болѣзнями женщины поражаются чаще мужчинъ и чаще послѣднихъ передаютъ свой недугъ женскому-же потомству, именно въ отношеніи 1,7 : 1. Англійскія статистики показываютъ, что на мужчинъ наслѣдственное помѣшательство переходитъ чаще отъ отца (въ 1,1 раза), а на женщинъ—отъ матерей (въ 1,3 раза чаще, чѣмъ отъ отцовъ). Авторъ самъ собралъ 1039 случаевъ наслѣдственнаго сумасшествія. Изъ этого числа 414 случаевъ падаетъ на мужчинъ, 625 на женщинъ, при чемъ родственники со стороны матери были причиной наслѣдственнаго сумасшествія въ 58%, а со стороны отца—въ 42%. Далѣе авторъ вычислилъ, сколько психически ненормальныхъ потомковъ приходится на cadaго отца и на каждую мать въ отдѣльности. Оказалось, что на 100 отцовъ приходится 137 сумасшедшихъ потомковъ (дочерей *больше*, чѣмъ сыновей въ 1,2 раза), а на 100 сумасшедшихъ матерей приходится 128 ненормальныхъ потомковъ (дочерей *больше* въ 1,6 раза); если-же и мать и отецъ страдали психическими разстройствами, то на каждую сотню приходилось ненормальныхъ потомковъ 178 (изъ послѣднихъ—дочерей почти вдвое *больше* сыновей). Эти данныя показываютъ, что наслѣдственность въ душевныхъ болѣзняхъ преимущественно отражается на *женскомъ* поколѣніи, будетъ-ли виновникомъ

страданія отецъ или мать; эти данныя, замѣчаетъ авторъ, противорѣчатъ Дарвиновской теоріи наслѣдственности, а также теоріи перекрестной наслѣдственности.

Г. X.

*R. Stewart: The Increase of general Paralysis in England and Wales: its Causation and Significance. (The journal of mental science. 1896, № 143).*

Въ Англіи и Валлисѣ за 1881—1891 гг. количество народонаселенія увеличилось на 11,7%, тогда какъ случаи психическаго помѣшательства—на 15,24%. На долю общаго прогрессивнаго паралича приходится 9% всего количества больныхъ, поступившихъ въ психіатрическія лечебницы Англіи и Валлиса. За 15 л. (1878—1892 гг.) количество паралитиковъ было 18,438, составляя 8% всего количества больныхъ въ 1878—1882 гг., 8,6%—въ 1883—1887 гг. и 8,9%—въ 1888—1892 гг.

Мужчины въ теченіи послѣдняго пятилѣтія заболѣвали въ 19 разъ чаще женщинъ; зажиточные и обезпеченные слои общества—вдвое чаще бѣдняковъ, среди которыхъ случаи прогрессивнаго паралича, по мѣрѣ наростанія послѣдняго среди богатыхъ, замѣтно рѣже попадаются. Наростаніе проявляется больше всего въ молодомъ, цвѣтущемъ возрастѣ (35—44 гг.) и равняется 0,9 по мѣрѣ увеличенія населенія на 10.000. Женатыя въ 5 разъ чаще поражаются холостыхъ, а замужнія—въ 60 разъ чаще незамужнихъ; такъ въ 1878—1882 гг. съ наростаніемъ народонаселенія на 10,000 человекъ, количество прогрессивныхъ паралитиковъ среди холостыхъ наростало на 3,5, а среди женатыхъ на 6,0; въ 1888—1892 наростаніе среди первыхъ равнялось 3,7, а среди послѣднихъ—6,2. Наростаніе прогрессивныхъ паралитиковъ преимущественно проявляется въ обширныхъ многолюдныхъ центрахъ—приморскихъ, мануфактурныхъ; въ деревняхъ, селахъ—уменьшеніе. Причины—1) алкоголизмъ, 2) венерическія болѣзни (сифилисъ). 3) половыя излишества.

Выводъ: постепенное наростаніе прогрессивнаго паралича помѣшанныхъ указываетъ на преждевременное вымирание—физическое и нравственное—націи.

Г. X.