

страданія отецъ или мать; эти данныя, замѣчаетъ авторъ, противорѣчатъ Дарвиновской теоріи наслѣдственности, а также теоріи перекрестной наслѣдственности.

Г. Х.

*R. Stewart: The Increase of general Paralysis in England and Wales: its Causation and Significance. (The journal of mental science. 1896, № 143).*

Въ Англіи и Валлисѣ за 1881—1891 гг. количество народонаселенія увеличилось на 11,7%, тогда какъ случаи психическаго помѣшательства—на 15,24%. На долю общаго прогрессивнаго паралича приходится 9% всего количества больныхъ, поступившихъ въ психіатрическія лечебницы Англіи и Валлиса. За 15 л. (1878—1892 гг.) количество паралитиковъ было 18,438, составляя 8% всего количества больныхъ въ 1878—1882 гг., 8,6%—въ 1883—1887 гг. и 8,9%—въ 1888—1892 гг.

Мужчины въ теченіи послѣдняго пятилѣтія заболѣвали въ 19 разъ чаще женщинъ; зажиточные и обезпеченные слои общества—вдвое чаще бѣдняковъ, среди которыхъ случаи прогрессивнаго паралича, по мѣрѣ наростанія послѣдняго среди богатыхъ, замѣтно рѣже попадаются. Наростаніе проявляется больше всего въ молодомъ, цвѣтущемъ возрастѣ (35—44 гг.) и равняется 0,9 по мѣрѣ увеличенія населенія на 10.000. Женатыя въ 5 разъ чаще поражаются холостыхъ, а замужнія—въ 60 разъ чаще незамужнихъ; такъ въ 1878—1882 гг. съ наростаніемъ народонаселенія на 10,000 человекъ, количество прогрессивныхъ паралитиковъ среди холостыхъ наростало на 3,5, а среди женатыхъ на 6,0; въ 1888—1892 наростаніе среди первыхъ равнялось 3,7, а среди послѣднихъ—6,2. Наростаніе прогрессивныхъ паралитиковъ преимущественно проявляется въ обширныхъ многолюдныхъ центрахъ—приморскихъ, мануфактурныхъ; въ деревняхъ, селахъ—уменьшеніе. Причины—1) алкоголизмъ, 2) венерическія болѣзни (сифилисъ). 3) половыя излишества.

Выводъ: постепенное наростаніе прогрессивнаго паралича помѣшанныхъ указываетъ на преждевременное вымирание—физическое и нравственное—націи.

Г. Х.