

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Рефераты по психі атреї, невропатології и физіології нервової системи.

Dr. *Jahrmärker*. Beitrag zur Dementia paralytica beim weiblichen Geschlecht. — Allg. Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 58 H. 1. 1901.

Изъ всего клиническаго материала психіатрической клиники проф. Tuczek'a въ Марбургѣ за послѣднія два десятилѣтія авторъ собралъ 54 случая прогрессивнаго паралича у женщинъ и подвергнулъ ихъ подробному разбору. По семейному положенію больны распредѣлялись такъ: 7 незамужнихъ, 12 вдовъ и 35 замужнихъ; 7 изъ послѣднихъ были покинуты мужьями. Только 5 изъ всего числа больныхъ принадлежали къ обезпеченному классу, но за то у этихъ больныхъ можно было обнаружить ясное предрасположеніе къ душевнымъ заболѣваніямъ. Всѣ остальныя больныя происходили изъ недостаточнаго класса (работницы, прачки, швеи), причемъ въ большинствѣ этихъ случаевъ въ анамнезѣ имѣлось указаніе на тяжелую нужду, горе и заботы. Несомнѣнныи lues въ анамнезѣ имѣлъ мѣсто только въ 4 случаяхъ. Въ единичныхъ случаяхъ отмѣченъ вѣроятный lues, potus и наследственность. Психическія ненормальности, предшествовавшія прогрессивному параличу, наблюдались въ 3 случаяхъ. Относительно роли менструального периода авторъ не пришелъ къ определенному выводу, такъ какъ очень трудно установить, въ какихъ случаяхъ прекращеніе мѣсячныхъ могло являться вызывающимъ этиологическимъ моментомъ и

въ какихъ оно было лишь слѣдствiemъ самаго заболѣванія. Бредовая идея паралитичекъ отличались нѣкоторыми особенностями, свойственными вообще натурѣ женщины. Теченіе и продолжительность прогрессивнаго паралича у женщинъ не обнаруживали какихъ либо замѣтныхъ особенностей.

Б. Воротынскій

Dr. Habermaas. Ueber die Prognose der Epilepsie. Allg. Zeitschr. f. Psych. Bd. 58, Hf. 2—3. 1901.

Эпилепсія, принадлежить къ числу тѣхъ болѣзней, относительно которыхъ предсказаніе всегда является крайне неопределеннymъ.. Вопросъ объ излечимости эпилепсіи долго оставался совершенно открытымъ, и только со временемъ применения бромистыхъ препаратовъ при лечениі этого страданія прогнозъ при эпилепсіи сдѣлался болѣе благопріятнымъ. За послѣднее время нѣкоторые авторы заявляютъ, что свѣжие случаи чистой эпилепсіи при соотвѣтствующемъ лечениі могутъ быть вполнѣ излечеными. Различные наблюдатели неоднаково вычисляютъ процентъ выздоровленія при эпилепсіи: *Hufeland und Müller* принимаютъ 5%, *Laehr*—6%, *Achermann*—7,6%, *Wildermuth*—8,5%, *Reynold*—10%, *Alt*—12,5.

Авторъ реферируемой работы свои выводы основывалъ на матеріалѣ, достигающемъ 937 случаевъ эпилепсіи (въ томъ числѣ 74 амбулаторныхъ). Изъ этого числа 25% приходилось на дѣтей, не достигшихъ 10-лѣтняго возраста, 58% падало на возрастъ отъ 11 до 20 л., 17%—на возрастъ отъ 21 до 30 л. и только 2% всѣхъ эпилептиковъ были въ возрастѣ болѣе 30 лѣтъ. Почти въ половинѣ всѣхъ наблюдавшихся случаевъ больные до поступленія въ Лечебницу страдали эпилепсіей въ теченіе болѣе 5 лѣтъ.

Выводы автора: 1) эпилепсія излечивается въ 10,3%; 2) 17,3% у эпилептиковъ не наблюдается интеллектуального пораженія; 3) 21% эпилептиковъ остаются способными вполнѣ къ труду, 30%—только отчасти, а 49% оказываются неспособными ни къ какой работѣ; 4) продолжительность жизни эпилептиковъ въ среднемъ достигаетъ 25 лѣтъ; 5) въ 60% всѣхъ случаевъ сама эпилепсія, какъ таковая, приводитъ къ смерти.

Б. Воротынскій.