

въ какихъ оно было лишь слѣдствіемъ самаго заболѣванія. Бредовыя идеи паралитически отличались нѣкоторыми особенностями, свойственными вообще натурѣ женщины. Теченіе и продолжительность прогрессивнаго паралича у женщинъ не обнаруживали какихъ либо замѣтныхъ особенностей.

*Б. Воротынский*

Dr. *Habermaas*. Ueber die Prognose der Epilepsie. Allg. Zeitschr. f. Psych. Bd. 58, Hf. 2—3. 1901.

Эпилепсія, принадлежитъ къ числу тѣхъ болѣзней, относительно которыхъ предсказаніе всегда является крайне неопредѣленнымъ.. Вопросъ объ излечимости эпилепсіи долго оставался совершенно открытымъ, и только со времени примѣненія бромистыхъ препаратовъ при леченіи этого страданія прогнозъ при эпилепсіи сдѣлался болѣе благопріятнымъ. За послѣднее время нѣкоторые авторы заявляютъ, что свѣжіе случаи чистой эпилепсіи при соответствующемъ леченіи могутъ быть вполнѣ излеченными. Различные наблюдатели неодинаково вычисляютъ процентъ выздоровленія при эпилепсіи: *Hufeland* und *Müller* принимаютъ 5%, *Laehr*—6%, *Achermann*—7,6%, *Wildermuth*—8,5%, *Reynold*—10%, *Alt*—12,5.

Авторъ реферируемой работы свои выводы основывалъ на матеріалѣ, достигающемъ 937 случаевъ эпилепсіи (въ томъ числѣ 74 амбулаторныхъ). Изъ этого числа 25% приходилось на дѣтей, не достигшихъ 10-лѣтняго возраста, 58% падало на возрастъ отъ 11 до 20 л., 17%—на возрастъ отъ 21 до 30 л. и только 2% всѣхъ эпилептиковъ были въ возрастѣ болѣе 30 лѣтъ. Почти въ половинѣ всѣхъ наблюдавшихся случаевъ больные до поступленія въ Лечебницу страдали эпилепсіей въ теченіе болѣе 5 лѣтъ.

Выводы автора: 1) эпилепсія излечивается въ 10,3%; 2) 17,3% у эпилептиковъ не наблюдается интеллектуальнаго пораженія; 3) 21% эпилептиковъ остаются способными вполнѣ къ труду, 30%—только отчасти, а 49% оказываются неспособными ни къ какой работѣ; 4) продолжительность жизни эпилептиковъ въ среднемъ достигаетъ 25 лѣтъ; 5) въ 60% всѣхъ случаевъ сама эпилепсія, какъ таковая, приводитъ къ смерти.

*Б. Воротынский.*