

P. T. Hald. Ein Fall von Veronalvergiftung. (Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, 15 Juni 1904).
Случай отравления вероналомъ.

Верональ, который въ послѣднее время рекомендованъ какъ новое снотворное и нѣкоторыми врачами давался иногда до 8,0 въ сутки, въ иныхъ случаяхъ вызываетъ даже въ малыхъ дозахъ непріятные побочные симптомы съ характеромъ отравленія, въ виду чего высказывались голоса объ изыятіи этого опаснаго средства изъ врачебной практики. Наблюденіе, о которомъ здѣсь будетъ рѣчь, нѣсколько измѣняетъ эти опасенія. Авторъ наблюдалъ случай, гдѣ одна его пациентка,

страдавшая головными болями и бессонницей и принимавшая по этому поводу верональ по $\frac{1}{2}$ grm, однажды утромъ (повидимому съ цѣлью отравленія) приняла его сразу 9,0; только спустя 8 час. послѣ этого она была найдена въ глубокомъ снѣ, причѣмъ ей оказана была первоначальная медицинская помощь, а потомъ она была доставлена въ больницу, гдѣ и подверглась соотвѣтствующей терапіи. Больная находилась все время въ сопорозномъ состояніи почти въ теченіи 3 сутокъ, при чемъ она порывисто двигала головою назадъ и впередъ, въ туловищѣ наблюдались тетанообразныя судорги, на кожѣ была эритема и мѣстами пузыри, похожіе на ретропигус. Моча не указывала на разстройство почекъ. Несмотря на тяжелое теченіе, больная черезъ 3 дня проснулась, а на 4-ый уже чувствовала себя совсѣмъ здоровой; такъ какъ промываніе желудка было сдѣлано спустя 8 час. послѣ приѣма веронала, то можно думать, что всѣ 9,0 всосались желудкомъ и несмотря на это больная осталась жива; такимъ образомъ этотъ случай по мнѣнію автора показываетъ, что при отравленіяхъ вероналомъ можно ставить хорошій прогнозъ. Двиганіе головою то назадъ то впередъ, тетанообразныя судорги авторъ считаетъ патогномическимъ признакомъ при отравленіи вероналомъ.

В. Болдыревъ.