

*G. Deny et M. Renaud.* Confusion hallucinatoire aigue et insuffisance hepaticque (Deux planches hors texte). L'encephale. 1906, Mars — Avril.

Острая спутанность очень часто является послѣдствіемъ отравленія нервныхъ клѣтокъ токсическими продуктами, выдѣляемыми бактеріями или вырабатываемыми самимъ организмомъ.

Въ частности описываются случаи, гдѣ нарушеніе функций печени и почекъ даетъ происхождение бреда.

У субъекта, печень и почки котораго болѣзненно измѣнены, самая легкая токсико-инфекціонная причина можетъ вызвать появленіе бреда, если печень не играетъ своей антитоксической и токсолитической роли, и если яды, не будучи болѣе разрушаемы и удаляемы, накаплиются въ организмѣ.

Авторы описываютъ случай везаническаго бреда у женщины 38 л. Б-ная безъ явнаго психическаго предрасположенія. Алкоголь, сифились отсутствуютъ. Душевная болѣзнь развилась быстро въ теченіе обычнаго разстройства желудка и кончилась смертью больной чрезъ 6 мѣсяцевъ.

При вскрытіи во всѣхъ органахъ найдены дегенеративныя измѣненія, встрѣчающіяся обыкновенно при интоксикаціяхъ. Кромѣ того въ печени констатированы измѣненія, свойственныя циррозу.

Сопоставляя клиническую и патолого-анатомическую картины, авторы устанавливаютъ слѣдующій порядокъ развитія болѣзненныхъ явленій.

У больной развивается легкое разстройство желудочно-кишечнаго тракта. Въ виду того, что печень не вполне нормальна и не можетъ въ совершенствѣ выполнять свою антитоксическую роль, быстро вспыхиваетъ бредъ. Ауто-интоксикація становится все болѣе и болѣе интенсивной и послѣ полнаго упадка всѣхъ органическихъ отправленій больная впадаетъ въ состояніе адинаміи.

Авторы подчеркиваютъ особенный интересъ случая, заключающійся въ томъ, что въ клинической картинѣ не наблюдалось тѣхъ явленій, которыя обычно бывають при нарушеніяхъ дѣятельности печени или при уреміи: желтуха, боли въ печени,

отеки, сердечно-сосудистыя и дыхательныя разстройства, (правда, моча не была изслѣдована).

Это наблюдение указываетъ, что въ случаяхъ подобнаго рода нужно ставить на второй планъ изслѣдованіе самаго бреда и старательно искать причину въ физическомъ состояніи больного.

*Н. Топорковъ.*

*Antonin Convers.* De l'action de l'acide formique en médecine mentale. Annales méd.—psychologiques. 1906, Mai—Juin.

Медицинскій міръ въ настоящее время съ большимъ интересомъ относится къ вопросу о терапевтическомъ дѣйствіи препаратовъ муравьиной кислоты.

Сlément устанавливаетъ увеличеніе мышечной силы, какъ результатъ примѣненія этихъ препаратовъ, и предсказываетъ послѣднимъ большую роль въ психіатрической терапіи, въ борьбѣ съ депрессивными состояніями.

Nichard приписываетъ имъ діуретическое дѣйствіе.

Авторъ разбираемой здѣсь статьи наблюдалъ до 30-ти больныхъ, которые въ теченіе мѣсяца принимали ежедневно по 2,50 грамма муравьино-кислаго натра.

Это были меланхолики съ ясными физическими разстройствами: общей астэніей, анорэксіей, исхуданіемъ,—спутанные больные съ обложеннымъ языкомъ, зловоннымъ дыханіемъ, вздутіемъ живота, атоніей пищеварительныхъ органовъ.

Большей частью наблюдалось въ теченіе первой же недѣли увеличеніе аппетита. Больные съ наклонностью къ ступору, казались, становились нѣсколько болѣе живыми. Обыкновенно наблюдалось соотвѣтствіе между улучшеніемъ физическаго и психическаго состоянія.

Вполнѣ признавая, что улучшеніе состоянія больныхъ, большей частью страдавшихъ излечимыми формами душевнаго разстройства, могло обусловливаться самостоятельнымъ поворотомъ болѣзни въ сторону излеченія, авторъ считаетъ себя въ правѣ указать на ту регулярность, съ которой наступало улучшеніе, какъ только начинали давать больному препараты муравьиной кислоты.