

Назначение этого препарата эпилептикамъ, больнымъ съ органическими формами душевнаго разстройства не давало хорошихъ результатовъ.

*Н. Топорковъ.*

*Ant. Convers.* Psychoses et neurasthenies en rapport avec les maladies du nez et du rhino-pharinx. 1906. Lyon, thèse.

Авторъ собралъ опубликованный въ специальной прессѣ клинической матеріалъ, относящійся къ разсматриваемому вопросу. Основываясь на этомъ матеріалѣ и на литературныхъ данныхъ, онъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ.

1) Болѣзни носовыхъ полостей и носоглоточнаго пространства, какъ острья, такъ и хроническія, часто оказываютъ явное вліяніе на психическія отправления.

2) Это вліяніе обыкновенно ограничивается уменьшеніемъ интеллектуальной дѣятельности, при чемъ главная роль принадлежитъ ослабленію вниманія. Однако, въ видѣ исключенія, могутъ развиваться и другія формы душевнаго разстройства.

3) Смотря по тому, какой субъектъ страдаетъ болѣзнью носа или носоглотки, т. е. идетъ ли дѣло о ребенкѣ, или о взросломъ, клинической типъ душевнаго разстройства будетъ различнымъ:

а) Въ дѣтскомъ возрастѣ наблюдается клинической типъ, извѣстный подъ именемъ такъ называемой апрозексіи, характеризующейся ослабленной способностью фиксировать вниманіе и происходящими отсюда разстройствами памяти. Къ этимъ симптомамъ въ большинствѣ случаевъ присоединяется непрерывное, безцѣльное возбужденіе, обусловливаемое психической неустойчивостью. Въ такихъ случаяхъ могутъ наблюдаться состоянія, близкія къ идиотизму.

в) Сущность различія между клиническимъ типомъ, который встрѣчается у взрослыхъ и предыдущимъ сводится къ тому, что у взрослого мы имѣемъ дѣло съ полнымъ умственнымъ развитіемъ. Поэтому здѣсь не можетъ развиваться состояніе идиотизма или тупоумія, которыя наблюдаются въ дѣтскомъ возрастѣ.

Клиническая картина, развивающаяся у взрослых, очень часто сводится къ известной степени неврастеніи, съ явлениями тоски, иногда очень выраженными. Нѣкоторые, предрасположенные субъекты могутъ доходить до состоянія ипохондріи и, даже, подъ вліяніемъ тоски, могутъ давать картину меланхолическаго бреда.

Этотъ клиническій типъ, наблюдаемый у взрослога, напоминаетъ таковой же ребенка всею интеллектуальной тупостью, ослабленной способностью фиксировать вниманіе и психической неустойчивостью. Эта психическая неустойчивость у взрослога выражается въ известномъ затрудненіи управлять теченіемъ своихъ мыслей.

4) Тяжесть клиническихъ явленій не зависитъ отъ природы и интензивности болѣзненнаго процесса въ носу или въ носоглоточномъ пространствѣ, но зависитъ главнымъ образомъ отъ предрасположенія больного; однако наиболѣе частой причиной развитія психопатическихъ явленій служатъ тѣ болѣзни, которыя обуславливаютъ суженіе отверстій носа, или носоглотки.

5) Измѣненія душевнаго состоянія могутъ объясняться различными взаимодействующими причинами.

а) На общее состояніе могутъ вліять: нарушеніе дыхательныхъ функцій, различные инфекціонные процессы, всасываніе патологическихъ секретовъ и проч.

в) Вліяніе сосѣдства пораженій носа или носоглотки на мозгъ, уши и такъ далѣе.

с) Рефлекторное вліяніе на мозговое кровообращеніе, на сердце, дыханіе и сексуальныя функцій.

6) Терапія сводится къ леченію носа или носоглотки. Однако у нервныхъ субъектовъ нужно быть очень осторожнымъ и избѣгать рѣзкихъ раздраженій. Подъ вліяніемъ леченія у дѣтей возстанавливается умственное развитіе; однако, если операція производится слишкомъ поздно, въ этомъ развитіи могутъ наблюдаться частичныя нарушенія. У взрослога душевное расстройство исчезаетъ, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ бредъ не успѣлъ окончательно сформироваться.

*Н. Топорковъ.*