

ставляет собою описаніе приложенныхъ фотограммъ съ микроскопическихъ препаратовъ.

А. III.

Патологическая анатомія.

Е. Medea. О подостромъ пораженіи переднихъ роговъ спинного мозга у взрослыхъ. Beitrag zur Kenntniss der Poliomyelitis anterior subacuta adultorum. Monatschrift. f. Psych. und Neurologie. Ioanuar-April. 1908.

Авторъ очень подробно описываетъ 4 случая подострого поліомієлита взрослыхъ и даетъ патолого-анатомическую картину заболѣванія на 16 фотографическихъ снимкахъ. Выводы автора: 1. Подострый поліомієлитъ взрослыхъ является довольно рѣдкой, но клинически обособленной формой; форма эта имѣетъ опредѣленную патолого-анатомическую основу, которая во многихъ случаяхъ *mutatis mutandis* напоминаетъ измѣненія при остромъ поліомієлитѣ (какъ онѣ установлены новѣйшими изслѣдователями, особенно Wickmann'омъ), по крайней мѣрѣ, относительно переднихъ роговъ.

2. Разстройства чувствительности, которыя наблюдаются въ рѣдкихъ, атипическихъ случаяхъ подострого поліомієлита, могутъ быть сведены, (при отсутствіи измѣненій въ периферическихъ нервахъ) къ легкимъ измѣненіямъ заднихъ столбовъ, которыя въ подобныхъ типическихъ случаяхъ могутъ быть обнаружены.

3. Рядомъ съ главными измѣненіями въ переднихъ рогахъ можно при подостромъ поліомієлитѣ констатировать иногда болѣе или менѣе существенныя измѣненія въ переднебоковыхъ столбахъ, находящіяся, по всей вѣроятности, въ зависимости отъ заболѣванія переднихъ роговъ.

4. Несмотря на то, что типическія формы аміотрофическаго бокового склероза и подострого поліомієлита представляются клинически и анатомически далекими другъ отъ друга, — онѣ могутъ иногда давать въ атипическихъ случаяхъ обѣихъ формъ находки патолого-анатомически весьма сходныя.

А. III.