

ственный сифилис. Меркуріальное леченіе дало значительное улучшеніе, хотя умственная область улучшалась слабо. По мнѣнію автора, Barbier и Combu въ монгольской идиотіи важную роль играетъ врожденный сифилис.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Laignel-Lavastein. Душевные разстройства вследствие пораженія железъ безъ выводныхъ протоковъ. (Destroubles psychiques par perturbations des glandes à sécrétion interne. La Progres medicale, 1908.

Авторъ на съѣздѣ французскихъ психіатровъ сдѣлалъ докладъ на вышеозначенную тему. При недостаточности и пораженіи *gl. thyreoidea* происходятъ: душевные разстройства, микседематозная идиотія, истинный инфантилизмъ, умственная отсталость, психастенія и проч. Въ случаяхъ усиленной функціи *gl. thyreoidea* — возбужденіе, бессонница, усиленная чувствительность, Бозедова болѣзнь и проч. При пораженіи *gl. thymus* — апатія, или усиленная возбудимость. При пораженіи *hypophysis* — депрессія, усиленная подавленность астенія, акромегалія и гигантизмъ. При пораженіи *gl. suprarenales*. — Аддисонова болѣзнь, душевная подавленность, безволіе, печаль, приступы тетаническіе, эпилептическіе, бредъ, кома и проч. При пораженіи *яичниковъ* — душевные разстройства и проч. При пораженіи *яичекъ* душевные разстройства, свойственныя отроческому возрасту, — климактерическому.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Labbé. Митральное суженіе и нанизмъ (Rétrécissement mitral par et nanisme. La Progres medical, 1908, 73).

Уже старыми психіатрами было замѣчено, что идиотизмъ часто сочетается съ сердцемъ малой величины. Этой причинѣ нѣкоторые приписывали и самый идиотизмъ. Въ послѣдствіи наблюдали что многіе идиоты малы ростомъ, карлики, *нанизмъ*. Изученіе этого нанизма и показало, что въ очень многихъ случаяхъ онъ сопровождается митральными суже-