

Уже давно установленъ фактъ, что эпилепсія въ большемъ числѣ случаевъ появляется на почвѣ алкоголизма родителей. Это положеніе авторъ подтверждаетъ новымъ доказательствомъ. Sichel, на основаніи статистическихъ данныхъ, доказалъ, что эпилепсія у евреевъ появляется въ меньшемъ числѣ, чѣмъ у христіанъ. Въ основѣ этого явленія, повидимому, лежитъ меньшій алкоголизмъ у евреевъ. По даннымъ автора, въ Берлинѣ 10% населенія еврей. Между тѣмъ, изъ поступившихъ эпилептиковъ въ Wuhlgarten евреевъ только 2,5%. Тоже положеніе подтверждаетъ для Японіи Koichi Miyake. Такимъ образомъ, несомнѣнно алкоголизмъ родителей является важною причиною не только эпилепсій, но даже и другихъ судорожныхъ заболѣваній, какъ истерія.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Perugia. Объ эпилептической аурѣ. La Reforma medica. 1908.

Эпилептическая аура является въ меньшей половинѣ случаевъ эпилепсій. Чаще является чувствительная аура, въ видѣ галлюцинацій, особеннаго ощущенія подъ ложечкой, въ половыхъ органахъ и проч. Особенно интересны тѣ случаи, гдѣ аура является на периферіи и конечностяхъ; тогда путемъ перетяжки органа можно прекратить прохожденіе ауры къ центру и тѣмъ предотвратить приступъ самой эпилепсій.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Parhon et Uréchie. Вліяніе эпохи менструацій на частоту эпилепсій. Revista Stüntelor medicale, 1908.

Въ большинствѣ случаевъ въ періодъ менструацій усиливаются и учащаются приступы эпилепсій,—но въ меньшинствѣ дѣло обстоитъ наоборотъ. Последнее необъяснимо. За то первое находитъ себѣ полное объясненіе въ овариальной секреціи и ея отношеніи къ общему метаболизму. Можно думать, что въ этихъ случаяхъ на усиленіе эпилепсій воздѣйствуетъ выдѣленіе кальція. Исслѣдованія Silvestri показали, что явленія эпилепсій находятся въ связи съ недостаточностью кальція въ нервной системѣ; какъ бы подтвержденіемъ этому и служить потеря кальція въ общей экономіи организма путемъ потери его въ выдѣляющейся при менструаціяхъ крови.

Проф. П. И. Ковалевскій.