

Dr. John Turner. Тромботическое происхождение припадка Some further observations bearing on the supposed thrombotic origin of epileptic. The Journal of mental saence, 1908.

Изслѣдованія Краинскаго, Сені и др. показали, что эпилепсія весьма часто бываетъ токсического происхожденія. Дальнѣйшее воздѣйствіе токсиновъ по автору таково: они передъ приступами производятъ за 24 приблизительно часа коагулацию крови, которая въ свою очередь образуетъ тромбы и закупориваетъ сосуды мозговой корки. Происходящій отъ этого стазъ крови и является причиной эпилептическаго приступа. Такая коагулациія является болѣе ускоренной у больныхъ съ тяжелой формою эпилепсіи, — особенно она ускорена у людей съ частыми припадками. Коагулациія начинаяется въ промежутки за 24 часа до припадка, а послѣ припадка слабѣе, чѣмъ въ нормальномъ состояніи. Въ промежуткахъ между припадками коагулациія крови одинаковая какъ въ нормальному состояніи. Такимъ образомъ ускореніе коагулациіи крови у эпилептиковъ происходитъ передъ припадками и во время припадка эпилепсіи. Aldren Turner полагаетъ развитіе припадка въ такой послѣдовательности: ускореніе коагулациіи крови, увеличенное и избыточное количество нуклео-протеиновой крови, повышеніе температуры при длительныхъ припадкахъ и лейкоцитозъ. Вероятно, что наличность токсиновъ способствуетъ образованію тромбовъ, закупорки, стазу крови и проявленію припадка. Bürker, Buckmeister, Megowan доказали, что ускореніе коагулациіи крови быстрѣе происходитъ вечеромъ, — почему и сами приступы эпилепсіи бываютъ чаще по вечерамъ и ночью. Повышеніе кровяного давленія понижаетъ скорость образованія коагулациіи, что не можетъ не служить показателемъ при назначеніи лечения эпилепсіи. Не должно забывать и того, что отданіе вѣкоторыхъ железъ организма способствуетъ повышенію кровяного давленія, а слѣдовательно и замедленіе коагулациіи крови.

Проф. П. И. Ковалевскій.

Dr. Donath. Объ истерической амнезіи въ связи съ ретроградной амнезіей. Neurolog. Centralb., 1908.

Авторъ проводитъ аналогію между истеричными анестезіей и амнезіей. Какъ истеричная анестезія является разбро-