

судорогъ, 2) при раздраженіи отдѣльныхъ точекъ получается общій двигательный эффектъ, тогда какъ у взрослыхъ при тѣхъ же условіяхъ вызываются болѣе частыя, дифференцированные и отдѣльныя движенія. *Баклушинскій.*

#### НЕРВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Прив.-доц. Преображенскій. Объ остромъ энцефалитѣ. Мед. обозр. 1910, № 21.

Въ современныхъ работахъ или совсѣмъ не упоминается о существованіи острого (негеморрагическаго) энцефалита, или о немъ упоминается вскользь, какъ о чѣмъ-то малоизвѣстномъ, сомнительномъ, а иногда какъ о вторичномъ процессѣ при различнаго рода воспаленіяхъ мягкой оболочки. Автору удалось прослѣдить четыре случая такого энцефалита, наличность котораго доказывается имъ макро и микроскопическими изслѣдованіями *post mortem*. Онъ подробно описываетъ какъ симптоматологію заболѣванія, такъ и патологическія измѣненія въ корѣ головного мозга при немъ. *Баклушинскій.*

К. М. Танашевъ. Парадоксальныя движенія верхняго вѣка при параличѣ глазодвигательнаго нерва (симптомъ Pseudo-Graefe). Труды и проток. Имп. Кавк. общ. апрѣль—октябрь 1910.

Симптомъ Graefe заключается въ томъ, что вѣко опускается неудовлетворительно при опусканіи взора, иногда даже наблюдается при этомъ судорожное, продолжающееся моментъ, движеніе кверху, при поднятіи же взора, поднимается преувеличенно энергично. При параличѣ n. oculomotorii наблюдается такое явленіе, что вѣко пораженнаго глаза 1) не слѣдуетъ за движеніемъ глаза внизъ или 2) дѣлаетъ при этомъ движеніе какъ разъ противоположное ожидаемому. Это явленіе носитъ названіе феномена Pseudo-Graefe. Авторъ демонстрируетъ случай паралича n. oculomotorii при цѣлости n. trochlearis и abducentis. Здѣсь симптомъ Pseudo-Graefe особенно ясенъ при взглядѣ налѣво (m. rect. int.), внизъ (m. rect. int. + obliq. sup.), налѣво внизъ rect. int. et obliq. sup.): ptosis при указанныхъ положеніяхъ глаза исчезалъ совершенно безъ помощи m. frontalis. Это явленіе авторъ объясняетъ тѣмъ, что при процессѣ выздоровливанія, при регенерации нерва, нервныя волокна, такъ сказать, ошибаются дорогой и попадаютъ не къ своему мускулу (въ данномъ случаѣ rect. inf. и rect. inter.), а къ другому (m. levator.—въ данномъ случаѣ). *И. Баклушинскій.*