

Пирадовъ. Къ вопросу о современномъ ученіи о Вазедовой болѣзни и ея леченіи. Труды и проток. И. Кавказ. м. общ. февраль—апрѣль 1910 г.

Изложивъ вкратцѣ исторію ученія о происхожденіи, сущности и леченіи morb. Basedowі, авторъ на основаніи литературныхъ данныхъ и собственнаго опыта приходитъ въ выводъ, что сущность болѣзни заключается въ гиперсекреціи железы (гипертиреоидизаціи) и леченіе ея должно сводиться въ нейтрализаціи избытка секрета. На этомъ основана серотерапія Базедовой болѣзни. Здѣсь рекомендуется Antithyreoidin (сыворотка тиреоидектонированныхъ барановъ) и молоко козъ, у которыхъ предварительно вырѣзана железа. Послѣдній методъ леченія употребляется авторомъ, который очень доволенъ имъ.

И. Баклушинскій.

П С И Х И А Т Р І Я.

V. Kafka. Полинуклеозъ церебро-спинальной жидкости при прогрессивномъ параличѣ. Ueber die Polynucleose im cerebrospinalis bei der progressiven Paralyse. Zeitschr. für die gesamt. Neurol. u. Psych. Bd. I, S. 468, 1910.

Авторомъ было произведено болѣе 450 изслѣдованій цереброспинальной жидкости у прогрессивныхъ паралитиковъ; полученные имъ результаты онъ резюмируетъ въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) Нерѣдко при прогрессивномъ параличѣ наблюдаются періодическія повышенія и пониженія содержанія многоядерныхъ лейкоцитовъ въ цереброспинальной жидкости, при чемъ число послѣднихъ можетъ достигнуть значительной величины, не являясь, однако, ни предвѣстникомъ, ни слѣдствіемъ какихъ-либо обострѣній заболѣванія, какъ то инсульта, состоянія возбужденія и повышение температуры. Увеличенія числа многоядерныхъ лейкоцитовъ въ цереброспинальной жидкости не идетъ параллельно съ нерѣдко наблюдающимися при этомъ заболѣваніи усиленіи полинуклеоза крови. 2) Наблюдавшееся нѣкоторыми авторами появленіе полинуклеоза послѣ инсультовъ вѣроятнѣе всего нужно считать случайнымъ совпаденіемъ. 3) Причину появленія многоядерныхъ лейкоцитовъ въ liquor cerebrospinalis нужно искать въ мѣстномъ процессѣ—въ обостреніи хроническаго менингита, захватывающаго нижніе участки спинного мозга.

В. Лихницкій.