

случаяхъ можно было констатировать различные признаки психической дегенерации.

Отравление эиროмъ представляетъ слѣдующія особенности:

Въ соматической сферѣ на первомъ планѣ стоятъ симптомы двигательнаго возбужденія; иногда встрѣчается половое возбужденіе, расстройства дыханія и чувство голода.

Среди измѣненій психической дѣятельности, наблюдающихся у такихъ больныхъ, нужно отмѣтить рѣзкую раздражительность, склонность къ агрессивнымъ поступкамъ и появленіе импульсивныхъ стремленій, конечнымъ слѣдствіемъ которыхъ можетъ явиться убійство. Многие изъ этихъ измѣненій напоминаютъ тѣ, которыя мы встрѣчаемъ у эпилептиковъ, обстоятельство тѣмъ болѣе интересное, что отравленіе эиროмъ можетъ вызвать появленіе эпилептоидныхъ припадковъ, сопровождающихся судорогами и потерей сознанія; такіе припадки, однако, встрѣчаются не часто. *В. Лихницкій.*

ХИРУРГІЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

T. Prout and A. Taylor. Перерѣзка заднихъ корешковъ въ случаѣ упорной гастралгіи у табетика Interspinal neurectomy for intractable tabetic gastralgia.—Journ. of Nervous and Ment. Diseases, 1910, № 7.

Больной 50 лѣтъ, 7 лѣтъ страдаетъ tabes dorsalis. Однимъ изъ раннихъ симптомовъ этого заболѣванія были жестокія боли въ области желудка, противъ которыхъ больной былъ принужденъ прибѣгать, въ теченіе болѣе 5 лѣтъ, къ впрыскиваніямъ морфія. Вслѣдствіе рѣзкихъ явленій морфинизма его не разъ пытались отучить путемъ постепеннаго уменьшенія дозъ, но какъ только количество морфія начинали уменьшать, боли становились невыносимыми. Наконецъ, *Prout* предложилъ прибѣгнуть къ оперативному вмѣшательству. Операція состояла въ односторонней ламинектоміи, послѣ которой 7—10 чувствительные корешки съ той и другой стороны были перерѣзаны.

Операція удалась вполне, приступы болей болѣе не повторялись, что дало возможность сразу значительно уменьшить количество морфія и приступить къ систематическому леченію морфинизма. *В. Лихницкій.*