

10) Кривыя, получаемыя при маниакально-депрессивномъ психозѣ отличаются большимъ разнообразіемъ. Не разъ наблюдалось уменьшеніе продолжительности рефлекса; при состояніяхъ маниакальнаго или депрессивнаго ступора обыкновенно имѣется замедленіе рефлекса.

11) При прогрессивномъ параличѣ встрѣчаются кривыя самаго разнообразнаго характера; у однихъ больныхъ продолжительность рефлекса значительно увеличена, размахъ великъ, у другихъ же имѣется уменьшеніе продолжительности рефлекса.

*В. Лихницкій.*

J. Pfahl. Графическое изображеніе двигательныхъ процессовъ, особенно при колѣнныхъ рефлексахъ. Ueber die graphische Darstellung von Bewegungsvorgängen, ins besonderen des Patellarreflexes. Zeitschr. für d. ges. Neurol. und Psychiatrie. Bd. I, s. 502 (1910).

Pfahl отмѣчаетъ, что при точномъ изученіи пателлярнаго рефлекса съ помощью графическихъ кривыхъ нужно имѣть въ виду то обстоятельство, что при изслѣдованіи даннаго рефлекса въ сидячемъ положеніи приходится учитывать не только эффектъ сокращенія мышцъ, явленіе рефлекторнаго характера, но считаться и съ вліяніемъ тяжести, земедляющей разгибательныя движенія ноги и ускоряющей сгибаніе. За первымъ, рефлекторнымъ сгибательнымъ движеніемъ слѣдуетъ рядъ маятникообразныхъ движеній, уже не имѣющихъ рефлекторнаго характера и зависящихъ отъ чисто физическихъ свойствъ мышцъ—отъ ихъ эластичности; движенія эти можно наблюдать и на трупѣ.

Для записыванія пателлярнаго рефлекса Sommer'омъ, Pandu и Weiler'омъ были предложены спеціальныя приборы, но всѣ они имѣютъ рядъ существенныхъ недостатковъ; однимъ изъ наиболѣе важныхъ это тогъ, что всѣ они предназначены для записыванія рефлекса въ сидячемъ положеніи.

Чтобы исключить дѣйствіе тяжести Pfahl, предложилъ записывать движенія ноги у субъекта, находящагося въ лежащемъ положеніи, и руководствуясь этимъ соображеніемъ и конструировалъ свой аппаратъ.

Къ работѣ приложенъ рядъ кривыхъ, полученныхъ съ помощью этого аппарата; одна изъ нихъ получена у здоро-

выхъ лицъ, другіе относятся въ различнымъ заболѣваніямъ, сопровождающимся повышеніемъ сухожильныхъ рефлексовъ.

*В. Лихницкій.*

## П С И Х І А Т Р І Я.

**А. Kronfeld.** Къ вопросу объ изученіи Вассермановской реакціи и ея распознавательномъ значеніи въ психіатріи. Beitrage zur Studium der Wassermanschen Reaction und ihrer diagnostischen Anwendung in der Psychiatrie. Zeitschr. für die ges. Neurol. und Psychiatrie. Bd. I, s. 376 (1910).

Первая часть статьи посвящена описанію методики Вассермановской реакціи и разбору теорій, предложенныхъ для объясненія ея механизма, вторая содержитъ клиническія данныя.

Въ 310 случаяхъ Kronfeld изслѣдовалъ cerebro-спинальную жидкость, въ 158—кровь, при чемъ производилъ не только реакцію по методу Wasserman'a, но примѣнялъ и модификацію Landsteiner'a, а такъ же и предложенный Dungen's'омъ методъ, предназначенный специально для изслѣдованія cerebro-спинальной жидкости. Параллельно съ этимъ онъ опредѣлялъ содержаніе бѣлка въ cerebro-спинальной жидкости и число лимфоцитовъ.

Изъ различныхъ заболѣваній первое мѣсто въ его наблюденіяхъ по числу случаевъ занимаетъ прогрессивный параличъ; относящіяся сюда случаи авторъ разбилъ на двѣ группы; въ первой существованіе прогрессивнаго паралича было установлено съ несомнѣнностью уже на основаніи однихъ клиническихъ данныхъ, во второй діагнозъ оставался не выясненнымъ.

Изъ 63 случаевъ первой группы изслѣдованіе cerebro-спинальной жидкости въ 60 дало положительный результатъ, въ 2-хъ—вѣроятный, и только въ 1 получена отрицательная реакція.

У 43 больныхъ второй группы [у нѣкоторыхъ изъ нихъ дальнѣйшее наблюденіе подтвердило предположеніе о существованіи прогрессивнаго паралича, тогда какъ въ остальныхъ оно обнаружило существованіе другихъ заболѣваній] данныя Вассермановской реакціи, которая производилась при помѣ-