

выхъ лицъ, другіе относятся въ различнымъ заболѣваніямъ, сопровождающимся повышеніемъ сухожильныхъ рефлексовъ.

В. Лихницкій.

П С И Х І А Т Р І Я.

А. Kronfeld. Къ вопросу объ изученіи Вассермановской реакціи и ея распознавательномъ значеніи въ психіатріи. Beitrage zur Studium der Wassermanschen Reaction und ihrer diagnostischen Anwendung in der Psychiatrie. Zeitschr. für die ges. Neurol. und Psychiatrie. Bd. I, s. 376 (1910).

Первая часть статьи посвящена описанію методики Вассермановской реакціи и разбору теорій, предложенныхъ для объясненія ея механизма, вторая содержитъ клиническія данныя.

Въ 310 случаяхъ Kronfeld изслѣдовалъ церебро-спинальную жидкость, въ 158—кровь, при чемъ производилъ не только реакцію по методу Wasserman'a, но примѣнялъ и модификацію Landsteiner'a, а такъ же и предложенный Dungen's'омъ методъ, предназначенный специально для изслѣдованія церебро-спинальной жидкости. Параллельно съ этимъ онъ опредѣлялъ содержаніе бѣлка въ церебро-спинальной жидкости и число лимфоцитовъ.

Изъ различныхъ заболѣваній первое мѣсто въ его наблюденіяхъ по числу случаевъ занимаетъ прогрессивный параличъ; относящіяся сюда случаи авторъ разбилъ на двѣ группы; въ первой существованіе прогрессивнаго паралича было установлено съ несомнѣнностью уже на основаніи однихъ клиническихъ данныхъ, во второй діагнозъ оставался не выясненнымъ.

Изъ 63 случаевъ первой группы изслѣдованіе церебро-спинальной жидкости въ 60 дало положительный результатъ, въ 2-хъ—вѣроятный, и только въ 1 получена отрицательная реакція.

У 43 больныхъ второй группы [у нѣкоторыхъ изъ нихъ дальнѣйшее наблюденіе подтвердило предположеніе о существованіи прогрессивнаго паралича, тогда какъ въ остальныхъ оно обнаружило существованіе другихъ заболѣваній] данныя Вассермановской реакціи, которая производилась при помѣ-

щеніи больныхъ, въ большинствѣ случаевъ соответствовали даннымъ, полученнымъ позднѣе.

Интересно отмѣтить то обстоятельство, что изслѣдованіе церебро-спинальной жидкости при различныхъ вторичныхъ и третичныхъ проявленіяхъ сифилиса обыкновенно даетъ отрицательные результаты; такъ изъ 20 случаевъ положительный результатъ былъ полученъ только въ 2-хъ (по модификаціи Dungen'a), да еще 1 далъ сомнительную реакцію (по Wasserman'у).

Въ 202 случаяхъ функциональных психозовъ и различныхъ органическихъ заболѣваній не специфическаго характера положительная реакція получилась только въ 13 случаяхъ, въ 6—спорная.

Обсуждая вопросъ о зависимости между Wasserman'овской реакціей и лимфоцитозомъ церебро-спинальной жидкости, авторъ говоритъ, что онъ не можетъ присоединиться къ мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей, полагающихъ, что между этими явленіями никакого параллелизма не существуетъ; строгаго параллелизма правда онъ не наблюдалъ, но всетаки, обычно существованіе положительной Вассермановской реакціи совпадаетъ съ наличностью болѣе или менѣе ясно выраженаго лимфоцитоза. Что касается процентнаго содержанія бѣлка и наличности положительной Wasserman'овской реакціи, то параллелизмъ между этими явленіями наблюдается только при прогрессивномъ параличѣ, при остальныхъ же заболѣваніяхъ установить какую-либо зависимость между ними не удается.

В. Лихницкій.

Т Е Р А П І Я.

H. Schnitzer. Къ современному положенію вопроса о леченіи эпилепсіи. Zum gegenwärtigen Stande der Epilepsiebehandlung. Zeitschr. für d. gesamt. Neurol. und Psych. Bd. II, s. 77 (1910).

Мѣры, предложенныя до сихъ поръ для борьбы съ эпилепсіей, авторъ дѣлитъ на 4 группы: 1) гигиеническіе, діететическіе и физическіе методы леченія, 2) органо-и серотерапія, 3) лекарственное и 4) хирургическое леченіе.

На мѣропріятіяхъ, относящихся къ 1-й и 2-й группѣ, авторъ останавливается недолго, ограничиваясь замѣчаніями общаго характера. Большая часть статьи посвящена обзору