

## П С И Х И А Т Р И Я.

**Seglas et Collin.** Психическій шокъ. Emotion choc. Psychose confusionnelle.—Presse medicale 1911.

У женщины 31 года съ наследственнымъ, предрасположеніемъ вслѣдъ за тяжелой домашней сценой, которую ей пришлось перенести (упреки мужа, узнавшаго объ изменѣ соей жены), развилось душевное заболѣваніе. Во все время болѣзни основнымъ симптомомъ была спутанность, при чемъ теченіе заболѣванія можно разбить на три періода: 1-й—спутанность, бредовые элементы, 2-й—спутанность явленія моторнаго возбужденія и 3-й—періодъ простой спутанности. Въ этомъ періодѣ началось постепенное улучшеніе, приведшее къ полному выздоровленію.

Когда больная выздоровѣла, у нея было констатировано существованіе амнези, захватывавшей не только все время болѣзни, но распространявшейся и на сцену, послужившую толчкомъ къ заболѣванію.

Авторы полагаютъ, что эмоціональное потрясеніе не только сыграло важную роль въ развитіи заболѣванія и было толчкомъ, возвавшимъ его появленіе, но положило извѣстный отпечатокъ и на его клиническую картину, такъ какъ бредовыя идеи, высказываемыя больною, находились въ извѣстной связи съ характеромъ перенесенной эмоціи.

*В. Лихницкій.*

## Т Е Р А П И Я.

**M. Neuchaus.** Опыты съ салъварзаномъ при сифилисѣ центральной нервной системы. Erfahrungen mit Salvarsan, speziell bei Lues des Zentralnervensystems. Münch. med. Woeh. 1911.

Авторъ произвелъ всприскиваніе салъварзана въ 16 случаяхъ сифилитическихъ пораженій центральной нервной системы. По характеру заболѣванія случаи эти распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: Lues III cerebrospinalis—7, Poliomyelitis subacuta (luetica?)—1, Tabes—5, Paralysis progressiva—2.

Въ большинствѣ случаевъ авторъ пользовался внутримышечными инъекціями: во многихъ случаяхъ было сдѣлано по 3—4 инъекціи а промежутокъ около 4-хъ недѣль.

Ни въ одномъ случаѣ, даже въ тѣхъ, гдѣ было пораженіе п. optici, *Neuchaus* не наблюдалъ неблагоприятнаго влія-