

лѣчебныхъ заведеніяхъ Западной Европы, авторъ обратилъ вниманіе на полное отсутствіе мочащихся въ иностранныхъ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ въ противоположность массѣ мочащихся въ русскихъ военныхъ госпиталяхъ. Далѣе, авторъ указываетъ, что у насъ мочащихся часто находятъ неизлѣчимыми, въ иностранныхъ же арміяхъ ихъ легко вылѣчиваютъ. Авторъ различаетъ семь разновидностей недержанія мочи. Первые три группы:—идіоты и слабоумные, страдающіе приобрѣтенными органическими пораженіями спинного мозга и лица съ неполнымъ развитіемъ спинного мозга—въ службѣ не годны, и вопросъ объ испытаніи ихъ рѣшается изслѣдованіемъ нервной системы; Четвертая группа—*diabetes insipidus*, пятая—заболѣванія мочевого пузыря и шестая—мышечное и нервное истощеніе вслѣдствіе тяжелаго и непривычнаго труда военнаго обученія.

Особенное вниманіе авторъ обращаетъ на седьмую группу. Сюда онъ относитъ тѣ непонятные случаи, гдѣ нѣтъ никакихъ признаковъ шести предыдущихъ группъ, есть незначительное количество дегенеративныхъ, истерическихъ и неврастеническихъ данныхъ, жомы пузыря достаточны и, можетъ быть, лишь емкость его нѣсколько мала. Авторъ полагаетъ, что истерія и неврастенія не являются причиной недержанія мочи однако онъ не считаетъ всѣхъ такихъ больныхъ симулянтами. По его мнѣнію, здѣсь имѣется некультурная терпимость къ нечистоплотности и значительная доля аггравациі. Лѣченіе такихъ больныхъ состоитъ въ непрестанномъ надзорѣ за ними днемъ и ночью и въ воспитаніи ихъ въ соотвѣтствующемъ направленіи.

Р. Авербухъ.

П С И Х І А Т Р І Я.

Д-ръ А. Д. Коцовскій. О такъ называемомъ «Балтскомъ движеніи» въ Бесарабіи.—Труды Бесарабскаго Общества Естествоиспытателей. т. III, 1912 г.

Начало т. наз. Балтскаго психоза относится къ 1909 году. Въ связи съ массовымъ паломничествомъ крестьянъ Бессарабской и Херсонской губ. въ Балтскій монастырь, среди паломниковъ появились отдѣльныя нервно-психическія заболѣванія, принявшія вскорѣ массовый характеръ. Всѣ заболѣвшіе—молдоване. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ безу-

словно устанавливается связь съ бессарабскими монастырями. Заболѣваніе носить характеръ истерическаго психоза (эликушества); ово сопровождается выкрикиваньями, икотой, рвотой, судорогами съ потерей сознанія, иногда галлюцинаціями. Всѣ эти симптомы имѣють тѣсную связь съ ученьемъ, проповѣдывавшимся тогда въ Балтскомъ и окрестныхъ монастыряхъ. По этому ученію, за грѣхи людей въ нихъ вселяется дьяволъ; онъ поселяется въ животѣ и производитъ всѣ вышеописанные симптомы. Избавиться отъ него можно постомъ, молитвой, отказомъ отъ вина и табаку, отчитываніемъ, хожденіемъ по монастырямъ и пожертвованіями на обители, а также совершеніемъ особаго крестнаго знамени.

Среди заболѣвшихъ много лицъ съ психопатической конституціей, такихъ, которые до своего паломничества въ монастыри проявляли признаки душевныхъ и нервныхъ болѣзней. Несомнѣнно, однако, что здѣсь имѣются и совершенно здоровые люди. Определить количественное соотношеніе того и другого элемента невозможно.

Исключительное распространеніе психоза среди молдаванъ авторъ объясняетъ сильнымъ развитіемъ алкоголизма въ этой средѣ, низкимъ умственнымъ уровнемъ и вліяніемъ проповѣди на родномъ языкѣ молдаванскихъ іеромонаховъ бессарабскихъ монастырей.

Р. Авербухъ.

Н. А. Юрманъ. Вѣсь тѣла при прогрессивномъ параличѣ оттисекъ—«Русскій врачъ», № 26, 1912 г.

Материаломъ для реферируемой работы послужили кривыя вѣса 36 паралитиковъ изъ отдѣленія душевныхъ болѣзней при Петербургскомъ Николаевскомъ военномъ госпиталѣ.

При изученіи этихъ кривыхъ авторъ обратилъ вниманіе на особаго рода волны, наблюдаемая въ теченіе всей болѣзни. Въ противоположность взглядамъ другихъ авторовъ, по которымъ кривая вѣса при параличѣ не даетъ даже двухъ полныхъ волнъ, авторъ наблюдалъ цѣлый рядъ волнъ, характерное волнообразное теченіе болѣзни. Наибольшаго вѣса паралитики достигаютъ весной и въ декабрѣ, болѣе же всего вѣсь падаетъ въ осенніе мѣсяцы. Иногда подъемъ волны и спускъ ея происходятъ скачками, давая рядъ вторичныхъ волнъ. Часто этихъ вторичныхъ волнъ не наблюдается, вѣсь тѣла стремительно повышается и такъ же быстро падаетъ. Всѣ эти