

РЕФЕРАТЫ.

ТЕРАПИЯ.

Jul. Donath. Нуклеиновокислый натрій въ лѣченіи ранняго слабоумія. *Natrium nucleicum Behandlung der Dementia Praecox. Zeitschr. f. die ges. Neur. und Psychiatrie.* 1913. В. 19, Н. 2.

Авторъ съ 1907 г. примѣняетъ N. nuclein. при Dem. praecox. Онъ даетъ 1,0—4,0. въ восходящихъ дозахъ до 14,8 N. nuclein. въ общей суммѣ для одного больного въ 10% растворѣ. Онъ ссылается на работу *Lundkall*, нашедшаго у больныхъ d. p. т. наз. Blutkrisen—олигоцитемію и гиорлейпекцитозъ (полинуклеозъ), совпадающіе съ періодами возбужденія больныхъ, въ то время какъ въ спокойное время кровь содержитъ нормальное число эритроцитовъ эти обстоятельства аналогичны съ данными при бактеріеміяхъ и позволяютъ предположить экзогенный ядъ: въ такомъ случаѣ N. nuclein. долженъ явиться, какъ и при Paral. progr. Leucocytagogum.

Авторъ выписываетъ: *Natr. nuclein.* 1,0—4,0 *N. chlor. pur.* 0,1—0,4. *Solve leni calore in. destill. steril* 10,0—40,0. Подкожно съ помощью 5—10,0 *Record* въ области спины, груди; предварит. 1% *Novocain.* 5,0, не мнимая иглы. Интервалы въ 4—5 дней; начинаютъ съ 0,5—1,0 N. nuclein. на разъ. Постельный режимъ; измѣренія t° —черезъ 2 часа; важно ежедневное подсчитываніе лейкоцитовъ до и послѣ инъекціи до момента исчезновенія лейкоцитоза.

Каждый изъ 14 больныхъ, лѣченныхъ съ октября 1907 г. до іюня 1913, получили отъ 5,0—до 29,0 N. nuclein. въ 5—11 инъекцій; 3 изъ нихъ выздоровѣли, т. е. вполне здоровы внѣшне и исполняютъ свои обязанности; (5-ти улучшение—изъ нихъ 2 вернулись къ работѣ; у 3 ухудшеніе послѣ улучшенія; 3 остаются неизлѣченными.

Авторъ заключаетъ, что % выздоровленій и улучшеній значительно выше того, что даетъ Dem. pr. безъ леченія, и прежнее содержаніе больныхъ безъ леченія неправильно.

А. III.