

ломъ у больной отмѣчались лишь нѣкоторыя неправильности менструацій; родители ея здоровы, сестра истеричка).

Психозъ начался нѣсколько необычно для эклампсии—в теченіи 2-хъ недѣль паціентка представляла явленія депрессіи, затѣмъ наступило маниакальное состояніе, державшееся 4 дня и заключившееся первымъ судорожнымъ приступомъ (эпилептиформнымъ). В теченія ночи и слѣдующаго дня было 20 судорожныхъ припадковъ. Въ мочѣ бѣлокъ ($3\%_{00}$ — $6\%_{00}$), уробилинъ, гліалиновые и зернистые цилиндры.

Между приступами то полное затемнѣніе сознанія, двигательное безпокойство и галлюцинаціи, то спячка. В теченіи 6 дней наблюдаются судорожные приступы и явленія галлюцинагорвой спутанности, постепенно ослабѣвающіе. Затѣмъ наступили преждевременные роды, вызванныя смертью плода, послѣ чего судорожныхъ приступовъ уже не было и психическое разстройство стало быстро исчезать, такъ что черезъ недѣлю послѣ родовъ паціентка была уже вполне душевно здорова.

Авторы объясняютъ развитіе психоза въ этомъ случаѣ интоксикаціей организма, а слѣдовательно и мозговой коры двигательной и психической областей; интоксикація, явившаяся результатомъ альбуминуриі, вызвала своимъ вліяніемъ на двигательныя центры—судороги, а вслѣдствіе ассоціаціи центровъ повела къ явленіямъ психической спутанности, къ галлюцинаціямъ и бреду. Смерть плода и наступившіе вслѣдствіе этаго преждевременные роды послужили въ данномъ случаѣ моментомъ, освободившимъ организмъ больной отъ условій, благопріятствовавшихъ интоксикаціи, результатомъ чего и явилось быстрое выздоровленіе паціентки.

II. Скуридинъ.

Féré. Note sur l'influence de l'incontinence sexuelle pendant la gestation sur la descendance. „Archiv. de Neurolog“. V. XIX. № 112. 1905.

Féré описываетъ случай эпилепсии у 8-ми лѣтнаго мальчика, интересный преимущественно въ этиологическомъ отношеніи.

Больной был старшимъ сыномъ вполне здоровыхъ родителей. Послѣ его рожденія у матери было еще 3 здоровыхъ дѣтей и затѣмъ 1 выкидышъ. Вліяніе сифилиса абсолютно исключается. Самый тщательный анамнезъ не могъ указать какихъ либо дегенеративныхъ явленій среди предковъ родителей. Доискиваясь причины заболѣванія ребенка, *Féré* обратилъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство: родители, изъ опасенія имѣть большую семью, отличались большою воздержанностью въ половыхъ удовольствіяхъ, когда же наступила первая беременность, они не видѣли уже необходимости въ такомъ воздержаніи и стали злоупотреблять половыми отношеніями. Ввиду отсутствія какихъ либо другихъ причинъ, которыми можно было бы объяснить развитіе эпилепсіи у первенца, *Féré* и считаетъ *наибольше вѣроятной причинойъ эпилептической дегенерации ребенка половая излишество родителей*, допущенная во время беременности имъ.

Косвеннымъ подтвержденіемъ такого взгляда является то чувство отвращенія къ своимъ мужьямъ, которое испытываютъ нѣкоторыя беременныя женщины. Въ этихъ случаяхъ организмъ матери точно по инстинкту защищаетъ ребенка отъ грозящаго ему вырожденія.

Наблюденія зоологовъ относительно жизни различныхъ животныхъ также отмѣчаютъ тотъ фактъ, что самки послѣ оплодотворенія большею частью усиленно избѣгаютъ половыхъ сношеній; у животныхъ этотъ инстинктъ защиты своего потомства выраженъ даже въ болѣе рѣзкой степени, чѣмъ у людей.

II. Скуридинъ.

A. Marie.—Eunuchisme et Érotisme (Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière. № 5, 1906 г.).

Авторъ приводитъ наблюдаемый имъ въ Египтѣ случай душевнаго разстройства эротическаго характера съ соотвѣствующими обманамъ органовъ чувствъ.

Дѣло идетъ о 40 лѣтнемъ евнухѣ, подвергшемся полной кастраціи въ раннемъ дѣтствѣ.