

могут перейти границу просто „характера“ и стать „психопатіями“.

Д-ръ *Образцовъ* въ статьѣ „къ симптоматологіи алкоголизма“ рассматриваетъ четыре случая изъ своей практики, когда—согласно даннымъ *Rodiet* и *Gans'a*—замѣчалось любопытное и еще малоизвѣстное явленіе, именно, неодинаковость тактильных воспріятій на различныхъ половинахъ глазныхъ яблокъ. Явленіе это, можетъ быть, стоитъ въ связи съ состояніемъ кровообращенія въ лицѣ.

Д-ръ *Гаккебушъ* въ отдѣлѣ „Корреспонденція“, предлагаетъ, на основаніи принципа децентрализаціи, свой планъ обслуживанія психіатрической помощью населенія Харьковской губерніи.

И. Жилинъ.

Т е р а п і я .

Dr. Felix Mendel. Лѣченіе фибролизиномъ и его результаты. „Новое въ Медицинѣ“. №№ 1, 2, 3. 1908.

Фибролизинъ представляетъ собой двойное соединеніе тіозинамина и салицилового натрія, легко растворимое въ водѣ. Область примѣненія фибролизина—заболѣванія, сопровождающіяся развитіемъ фиброзной, интерстиціальной ткани. Въ этихъ случаяхъ фибролизинъ вызываетъ „разрыхленіе плотныхъ воспалительныхъ тяжей и размягченіе отложившихся патологическихъ продуктовъ, благодаря которому облегчается ихъ расщепленіе“. Примѣняется фибролизинъ въ формѣ внутримышечныхъ инъекціи, совершенно безболѣзненныхъ, — возможны также подкожныя и внутривенныя всприскиванія. Доза для взрослыхъ—2,3 раств. фибролизина, для дѣтей—не меньше половины этой дозы; число инъекціи колеблется, смотря по случаю, между 5-ю и 50-ю. Побочныхъ дѣйствій почти не наблюдается. Длинный перечень заболѣваній, пользованныхъ съ успѣхомъ фибролизиномъ, закончивается указаніемъ на „привосходный результатъ“, достигнутый при лѣченіи инъекціями фибролизина хроническихъ невритовъ, обусловленныхъ патолого-анатомически хроническимъ периневритомъ и уже не поддававшихся другимъ способамъ терапіи.

И. Жилинъ.