

мозгу. Интересно, что между этимъ спазмомъ діафрагмы и диссоциированнымъ дыханіемъ наблюдается нѣкоторая взаимная связь. Пока спазмъ діафрагмы продолжается, грудно-брюшныя дыхательныя движенія представляются нормально синергичными. Въ заключеніе авторъ высказываетъ мысль о необходимости и важности графическаго изображенія дыханія при нѣкоторыхъ нервныхъ заболѣваніяхъ.

*Веселитскій.*

„Гематоміэлія, осложненная симптомами Вазедовой болѣзни“: все содержаніе статьи д-ра Шапиро составляетъ поисаніе соотвѣтственнаго случая.

Прив.-доц. Н. Останковъ. „Гастрическіе кризы табетиковъ морфійнаго происхожденія“. Обзорніе Психіатріи. № 1. 1908 г.

Авторъ пришелъ къ неутѣшительному заключенію, что „морфій и его дериваты могутъ при хроническомъ употребленіи вызывать у табетиковъ настоящіе гастрическіе кризы; временно подавляя припадокъ, морфій, на ряду съ другими антинеуралгическими средствами, обусловливаетъ скорѣйшій возвратъ болѣе жестокихъ слѣдующихъ приступовъ“.

*И. Жилинъ.*

А. Е. Щербаевъ. „Объ искусств. вызваніи, съ помощью вибраціи нѣкоторыхъ непостоянныхъ рефлексовъ“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1. 1908 г.

Въ работѣ А. Е. Щербака описываются опыты съ примѣненіемъ этого метода и ихъ результаты. Оказалось, что посредствомъ мѣстной вибраціи можно было вызвать у лицъ, подвергшихся изслѣдованію, до того отсутствовавшіе непостоянные рефлексы: приведеніе стопы при постукиваніи въ области *mall. int.* и клонусъ приводящихъ стопу мышцъ; отведеніе стопы при постукиваніи въ области *mall. externi*; приве-