

деніе стопы при постукиванні въ области mall. ext.; разгибаніе пальцевъ при постукиванні по тылу стопы; сгибаніе пальцевъ при постукиванні по тылу стопы; сгибаніе и разгибаніе пальцевъ при раздраженіи кожи подошвы; разгибаніе голени при постукиванні по tuberositas tibiae. Между прочимъ, сгибаніе пальцевъ ноги при постукиванні по тылу стопы, считавшееся до сихъ поръ признакомъ органическаго страданія нервной системы, удалось получить и въ случаѣ функциональнаго заболѣванія. Авторъ такимъ путемъ приходитъ къ выводу, что „методъ мѣстной вибраціи можетъ, дѣйствительно, оказывать извѣстныя услуги діагностикѣ, помогая установить клиническое значеніе нѣкоторыхъ непостоянныхъ рефлексовъ“.

*И. Жилинъ.*

Ермаковъ. „Эпилепсія въ русско-японскую войну“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1, 1908 г.

Большинство эпилептиковъ, бывшихъ подъ наблюденіемъ автора, было принято на службу уже больными эпилепсіей, — весьма немногіе лишь впервые на войнѣ проявили свое заболѣваніе, но и въ этомъ случаѣ можно было констатировать наличность эпилептическаго діатеза. Тягостныя условія походной жизни и войны вліяли качественно на форму припадковъ: ночные приступы уступали мѣсто дневнымъ, часто встрѣчались психическіе эквиваленты эпилепсіи.

*И. Жилинъ.*

Крамеръ. „Къ вопросу о періодическомъ параличѣ конечностей“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1, 1908 г.

Описанъ случай подобнаго заболѣванія нервной системы. Обычная его картина заключается въ томъ, что при отсутствіи какихъ-либо разстройствъ со стороны сознанія, черепныхъ нервовъ, сфинктеровъ и чувствительности наступаютъ

время от времени симметрические параличи мышц шеи, туловища и конечностей съ полнымъ угасаніемъ сухожильныхъ рефлексовъ и рѣзкимъ пониженіемъ электровозбудимости. Описанный случай протекалъ съ наличностью міастеническихъ симптомовъ. Въ этиологіи вѣроятна интоксикація со стороны кишечника, нарушающая, быть можетъ, внутримышечный обменъ.

И. Жилинъ.

Д-ру Лазареву удалось наблюдать рѣдкій случай типичной „мераліи въ области распространенія *n. cutanei femoris medii*“, тогда какъ обычно поражается *n. cutaneus extern.* Предположено было сдавленіе нерва въ сосудистомъ пучкѣ железами, но проверить это операціей не удалось. (Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1. 1908 г.).

И. Жилинъ.

Прив.-доц. Шкаринъ. Волѣзнь Basedow'a въ раннемъ возрастѣ. Врачебная газета. № 2. 1908 г.

На основаніи соотвѣтствующей литературы и собственнаго опыта, авторъ приходитъ къ такимъ заключеніямъ объ особенностяхъ теченія Basedow'ой болѣзни въ дѣтскомъ возрастѣ: болѣзнь протекаетъ быстрѣе, чѣмъ у взрослыхъ; аритмія пульса наблюдается крайне рѣдко; зобъ—незначителенъ; exophthalmus—слабъ; симптомы Graefe, Möbius'a и Stellwag'a наблюдаются рѣдко; ростъ дѣтей быстро идетъ впередъ.

И. Жилинъ.

Д-ра Вухштабъ и Хувинъ. Къ клиникѣ параличей діафрагмы. Врачебная газета. № 3. 1908 г.

Описано три случая паралича діафрагмы. Вниманіе авторовъ остановила на себѣ семіотика даннаго заболѣванія. Диаг-