

время от времени симметрические параличи мышц шеи, туловища и конечностей с полным угасанием сухожильных рефлексов и рѣзкимъ пониженіемъ электровозбудимости. Описанный случай протекалъ съ наличностью міастеническихъ симптомовъ. Въ этиологіи вѣроятна интоксикація со стороны кишечника, нарушающая, быть можетъ, внутримышечный обменъ.

*И. Жилинъ.*

Д-ру Лазареву удалось наблюдать рѣдкій случай типичной „мераліи въ области распространенія *n. cutanei femoris medii*“, тогда какъ обычно поражается *n. cutaneus externus*. Предположено было сдавленіе нерва въ сосудистомъ пучкѣ железами, но проверить это операцией не удалось. (Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. № 1. 1908 г.).

*И. Жилинъ.*

Прив.-доц. Шваринъ. Волѣзнь Basedow'a въ раннемъ возрастѣ. Врачебная газета. № 2. 1908 г.

На основаніи соотвѣтствующей литературы и собственнаго опыта, авторъ приходитъ къ такимъ заключеніямъ объ особенностяхъ теченія Basedow'ой болѣзни въ дѣтскомъ возрастѣ: болѣзнь протекаетъ быстрѣе, чѣмъ у взрослыхъ; аритмія пульса наблюдается крайне рѣдко; зобъ—незначителенъ; exophthalmus—слабъ; симптомы Graefe, Möbius'a и Stellwag'a наблюдаются рѣдко; ростъ дѣтей быстро идетъ впередъ.

*И. Жилинъ.*

Д-ра Вухштабъ и Хувинъ. Къ клиникѣ параличей діафрагмы. Врачебная газета. № 3. 1908 г.

Описано три случая паралича діафрагмы. Вниманіе авторовъ остановила на себѣ семіотика даннаго заболѣванія. Диаг-