

Бродскій. О вліянні событій революціоннаго періода на теченіе *tabes dorsalis*. Меднц. обозр. № 5. 1908 г.

Авторъ разсматриваетъ четыре случая *tabes'a*, въ которыхъ, подъ вліяніемъ нравственнаго потрясенія крайне быстро развилась тяжелая атаксія. Всѣ четверо больныхъ, находившихся подъ наблюденіемъ автора, оказались такъ или иначе участниками событій, свершавшихся въ достопамятный революціонный періодъ русской жизни. Эти событія и послужили для больныхъ непосредственнымъ источникомъ душевныхъ волненій, подъ ближайшимъ вліяніемъ которыхъ, при наличности другихъ явленій *tabes'a*, развилась атаксія. Между прочимъ, эти случаи *tabes'a* оказались „чистыми“, безъ примѣси какихъ-либо явленій истеріи, которая могла бы повести къ почти внезапно возникшей атаксіи, подобной имѣвшейся въ приводимыхъ случаяхъ спинной сухотки.

И. Жилинъ.

Эгизъ. Къ казуистикѣ церебральныхъ гемиплегій дифтерійнаго происхожденія. Меднц. обозр. № 5. 1908 г.

У дифтерійной дѣвочки, подвергнутой съ полнымъ успѣхомъ лѣченію соотвѣтствующей сывороткой, на восьмой день болѣзни появился парезъ мягкаго неба вмѣстѣ съ явленіями миокардита, на тринадцатый же день обнаружилась полная лѣвосторонняя гемиплегія. Дѣвочка умерла на тридцатый день послѣ происшедшей гемиплегіи отъ скарлатины, сопровождавшейся рядомъ серьезныхъ осложненій. При вскрытіи было констатировано ишемическое размягченіе праваго полушарія, захватившее кору мозга, *insula Rheilii*, подлежащее бѣлое вещество, *nucl. lentiform.*, наружную и внутреннюю капсулы и внутреннюю часть зрительнаго бугра. По поверхности мозга размягченіе занимало нижніе отдѣлы центральныхъ, — задніе отдѣлы лобныхъ, — передніе теменныхъ извилинъ, и двѣ первыхъ височныхъ извилинъ. Это обширное размягченіе авторъ склоненъ связать этиологически съ эмболомъ *art. fossae Sylvii*, занесеннымъ изъ сердца, хотя