

основаніі данныхъ анатомического изслѣдованія авторы заключаютъ о сифилитической природѣ заболѣванія. Интересъ случая заключается въ отсутствіи *surditas verbalis* несмотря на пораженіе зоны Wernicke.

*H. Osokinъ.*

M. Klippel et Fran ois-Dainville. Правосторонняя гемиплегія съ моторной афазіей тифознаго происхожденія. „Revue neurol.“ 1908, № 12.

Авторы наблюдали больную 50 л., у которой въ 20-ти лѣтнемъ возрастѣ во время тифа развился правосторонній параличъ и полная моторная афазія. За время наблюденія ея авторами, т. е. спустя 30 лѣтъ отъ начала заболѣванія было констатировано слѣдующее: правосторонній гемипарезъ съ замѣтнымъ похуданіемъ мышцъ, причемъ въ рукѣ это похуданіе походило на аміотрофію Aran Duchenne'a и разстройство болевого и термического чувства въ периферическихъ частяхъ пораженныхъ конечностей. Въ отношеніи произвольной рѣчи больная представляла лишь незначительный измѣненія и безъ труда при разговорѣ находила необходимыя слова.

Но письмо, какъ произвольное, такъ и подъ диктанть совершила съ трудомъ, дѣлая множество ошибокъ, несмотря на то, что до болѣзни имѣла для этого необходимыя знанія. Списывать могла, но не понимала смыслъ написанного. Читать не могла. Не всегда правильно называла и показанныя ей буквы. Не могла также произвести счисленія надъ небольшими числами, тогда какъ съ монетами разнаго значенія оперировала довольно свободно. *Surditas verbalis* не было. Авторы считаютъ, что разстройство рѣчи, представляемое больною главнымъ образомъ обусловливалось отсутствіемъ соответствующихъ упражненій.

*H. Osokinъ.*