

изъ полученныхъ кривыхъ, приведенныхъ въ статьѣ, авторы дѣлаютъ выводъ: кривыя меланхоликовъ даютъ короткій и относительно низкій подъемъ, спускающійся круто книзу и тянущійся довольно долгое время въ такомъ положеніи; кривыя отличаются отъ кривыхъ нормальныхъ людей своеобразиемъ типа: въ то время какъ у здороваго утомленіе укорачиваетъ кривую—у меланхолика ростъ утомленія—какъ правило относительно мало укорачиваетъ ее. Самой характерной особенностью кривыхъ кататониковъ является то, что онѣ при относительно значительной средней высотѣ даютъ чрезвычайно незначительную разницу между начальной и конечной высотой. Это также не наблюдается на кривыхъ нормальныхъ людей. Общее положеніе таково: меланхоликъ ведетъ эргографическую кривую съ многочисленными мелкими сокращеніями, кататоникъ съ меньшими количественно, но болѣе растянутыми сокращеніями. Изъ психофизиологическаго анализа обѣихъ формъ и характера кривыхъ авторы дѣлаютъ выводъ: что для меланхоліи кривыя могутъ имѣть діагностическое значеніе, чего нельзя сказать относительно кривыхъ у кататониковъ.

Статья снабжена 12 кривыми и очень подробно обоснована.

*А. Шоломовичъ.*

Ed. Cornu. О кожной и глазной реакціи въ психіатріи. (Annales Médico-Psychologiques. Mars-Avril. 1908).

По Calmeil'ю 4/5 смертей у душ. больн. бываетъ отъ туберкулеза, а по Marie et Rolet ихъ смертность втрое больше смертности остальнаго населенія Франціи, что обуславливается коварствомъ теченія этой болѣзни, требующимъ изысканія новыхъ методовъ діагностики. Авторъ приводитъ описаніе скаррификаціоннаго способа примѣненія туберкулина по методу Dr. Roux и послѣдующаго развитія прививной папулы въ теченіе отъ 36 часовъ до 20 дней. На 83 душевно-б., съ кожной скаррификаціей предплечья, реакція получилась у 75; у 23 больныхъ съ явнымъ туберкулезомъ реакція была въ 21 случаѣ;

въ случаяхъ мѣстнаго туберкулеза и сомнительныхъ получилось 43 реакц. на 48. Продолжительность реакціи въ ущербъ интенсивности была болѣе длинной у туберкулезныхъ отъ 9—20, у другихъ-же больныхъ отъ 3 до 12 дней. Хотя авторъ каждой реакціи Pirquet считалъ, что она имѣетъ значеніе только у грудныхъ младенцевъ и въ первые 2 года жизни, а выше этого возраста даже нетуберкулезные реагируютъ на инокуляцію туберкулиномъ. Cornu склоненъ признать этотъ методъ полнымъ въроятія. Calmett'овскую глазную реакцію онъ примѣнялъ, — вкапывая 1:100 туберкулина за нижнее вѣко въ лежащемъ положеніи, — у 40 и нашелъ, что 12 душ. больн. на 15 подозрѣваемыхъ въ туберкулезъ дали положительную реакцію.

А. Х.

Проф. Чижевъ. Значеніе политической жизни въ этиологіи душевныхъ заболѣваній. Обзоръ психіатріи, и экспериментальной психологіи. № 1—3. 1908 г.

Авторъ не видитъ, противно общепринятымъ взглядамъ, зависимости между политическими событіями и случаями помѣшательства якобы — на этой почвѣ. По его мнѣнію, „чѣмъ выше цивилизація, чѣмъ полнѣе, слѣдовательно, свобода, тѣмъ болѣе выживаетъ хилыхъ и убогихъ, въ томъ числѣ нервно и душевно-больныхъ“. И наоборотъ, стѣсненіе этой свободы, жестокое подавленіе попытокъ завоевать ее — не ведетъ къ возрастанію числа душевно-больныхъ: пожалуй, заболѣваютъ предрасположенные лица, и то случайно, внѣ прямого вліянія событий, давая тѣмъ поводъ къ сомнительнымъ выводамъ — о причинной связи между заболѣваніемъ и историческимъ моментомъ; вожаки же движенія обычно обладаютъ наиболѣе одаренной и стойкой духовной организаціей, безъ ущерба выносящей нравственныя волненія революціоннаго періода.

Проф. Чижевъ не согласенъ съ мнѣніемъ В. И. Яковенко, утверждавшимъ въ своей рѣчи на X Пирогов. Съѣздѣ, что къ новаторскимъ здоровымъ теченіямъ въ обществѣ „при- соединяются чаще всего неврастеники, истерики и вообще