© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2019
УДК 614.89

Перспективы развития технических средств и лекарственных форм для применения медицинских средств защиты

ИВАНОВ И.М., кандидат медицинских наук, майор медицинской службы (gniiivm_15@mil.ru)
ЧЕПУР С.В., профессор, полковник медицинской службы
НИКИФОРОВ А.С., доктор биологических наук
ЮДИН М.А., доктор медицинских наук, подполковник медицинской службы
АВЕРИНА А.Л.

Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
МО РФ, Санкт-Петербург

В статье дана оценка существующего уровня технических устройств и лекарственных форм, предназначенных для применения медицинских средств защиты, обсуждаются мировые тенденции и перспективы их ближне- и среднесрочного развития. Рассмотрены зарубежные образцы автоинъекторов, портативных ингаляторов, патч-помп, назальных, трансдермальных и буккальных форм. Представлены показатели эффективности различных лекарственных форм, их достоинства и недостатки, обсуждаются пути преодоления последних при оказании медицинской помощи на догоспитальных этапах и при транспортировке раненых и пораженных. При оценке возможности применения медицинских средств защиты в тех или иных технических устройствах или лекарственных формах необходимо учитывать характеристику их технологичности и готовности отечественной производственной базы к серийному производству и государственной регистрации в качестве лекарственных препаратов или изделий медицинского применения. Сделано заключение, что в ближайшей перспективе развития отечественных медицинских средств защиты целесообразно внедрение ингаляционных и интраназальных форм лекарственных препаратов для использования на догоспитальном этапе медицинской помощи.

К л ю ч е в ы е с л о в а: медицинские средства защиты, технические устройства, лекарственные формы.

Ivanov I.M., Chepur S.V., Nikiforov A.S., Yudin M.A., Averina A.L. — Prospects for the development of technical devices and dosage forms for the use of medical protection. The article assesses the current level of technical devices and dosage forms intended for the use of medical protective equipment, discusses global trends and prospects for their short-term and medium-term development. Considered foreign samples autoinjectors, portable inhalers, patch pump, nasal, transdermal and buccal forms. Presents indicators of the effectiveness of various dosage forms, their advantages and disadvantages, discusses ways to overcome the latter in the provision of medical care in the prehospital stages and in transporting the wounded and affected. When assessing the possibility of using medical protection in various technical devices or dosage forms, it is necessary to consider the characteristics of their manufacturability and the readiness of the domestic production base for mass production and state registration as medicines or medical products. It was concluded that in the short term for the development of domestic medical remedies it is advisable to introduce inhaled and intranasal forms of drugs for use in the prehospital medical care.

K e y w o r d s: medical protective equipment, technical devices, dosage forms.

Анализ современного уровня и перспектив совершенствования технических устройств для применения медицинских средств защиты (МСЗ), входящих в систему медицинского оснащения войск, должен основываться на данных о текущей обеспеченности

МСЗ, мировых тенденциях по использованию различных лекарственных форм (ЛФ) и технических устройств, степени «зрелости» новых технических решений, преимуществах и недостатках существующих МСЗ и способов их применения.

Существующая в Российской Федерации система оснащения догоспитальных этапов медицинской помощи включает относящиеся к МСЗ препараты в лекарственной форме таблетки для приема внутрь (препараты «Б-190», «Ондансетрон», «Доксициклин») и шприц-тюбик для внутримышечного введения (препараты «Пеликсим» и «Промедол»).

К числу лекарственных форм, в которых препараты могут быть применены для оказания доврачебной помощи, относят ампулы с растворами для внутримышечного введения (входят в состав упаковок и сумок).

За рубежом в последнее десятилетие возросло число исследований по созданию для передовых этапов медицинской помощи препаратов в новых лекарственных формах — назальных, трансбуккальных и трансдермальных.

Результаты успешной разработки и внедрения технических устройств — индивидуального автоинъектора и дозированного порошкового ингалятора — определяют необходимость анализа современных исследований в области технических решений относительно порядка применения существующих и перспективных МСЗ.

Современные разработки лекарственных средств и технических решений по использованию существующих и перспективных МСЗ

Индивидуальный автоинъектор (ИА) применяют за рубежом с 1970-х годов. В настоящее время ведущим производителем ИА для вооруженных сил США является фармацевтическая корпорация Meridian Medical Technologies, Inc. [8], осуществляющая выпуск:

- комбинированного препарата «Атропин+пралидоксим хлорид» в ИА BinaJect® или в ИА DuoDote®);
- препарата «Атропин» в ИА AtroPen® Auto-Injector;
- препарата «Диазепам» в ИА CANA Auto-Injector;
- препарата «Морфина сульфат» в форме ИА;
- комплект препаратов «Атропин» и «Пралидоксим хлорид» в двух ИА MARK I.

В США применение МСЗ в форме ИА из комплекта MARK I или комбинированного антидота ATNAA предписано при появлении признаков отравления ФОВ. В военно-морских силах регламентировано введение комбинированного антидота из двух ИА, содержащих атропин или пралидоксим. При отсутствии лечебного действия показано повторное введение двух комплектов MARK I или комбинированного антидота ATNAA (в порядке взаимопомощи) с интервалом 5 с, а также CANA. На этапе оказания врачебной помощи пораженным ФОВ тяжелой степени вводят атропин в форме ИА до наступления признаков перeatропинизации [11].

Военнослужащие частей армии Великобритании, дислоцированных в районах боевых действий, оснащаются двумя ИА с морфином [3].

На снабжение вооруженных сил Польши поставлен набор ИА IZAS-05 (RaviMED, Польша), включающий препараты: «Атропин», «Пралидоксим + атропин» и «Диазепам». В аналогичной форме выпускается морфин, а также экспортный вариант ИА с комбинированным препаратом «Обидоксим + атропин» [18].

С 1980-х годов ИА используют в гражданском здравоохранении для лекарственных средств на основе адреналина с целью купирования анафилактического шока. В странах Евросоюза в настоящее время зарегистрированы 9 коммерческих ИА с адреналином, в США — 3 ИА. В большинстве развивающихся стран, а также в Российской Федерации и в ряде стран СНГ, лекарственная форма адреналина в ИА до последнего времени была недоступна. Первый образец подобной продукции, препарат «Эпиджект», был зарегистрирован в нашей стране только в 2017 г.

Индивидуальный ингалятор. Индивидуальные портативные ингаляторы в Российской Федерации и за рубежом широко представлены в качестве изделий медицинского назначения для гражданского здравоохранения. Они имеются в армиях Европейского блока НАТО и США и представлены препаратами кортикостероидной структуры в дозированных

аэрозольных ингаляторах. В США кортикостероиды в этой форме вводят до 200 доз в течение первых часов после поражения пульмонотоксикантами с постепенным снижением дозы в течение нескольких дней [11].

Отдельное направление зарубежных исследований в области профилактики и лечения поражений ФОВ состоит в создании ингаляционных форм атропина. В США разработан дозированный порошок ингалятор MicroDose, предназначенный для введения микронизированной формы атропина сульфата на этапах медицинской эвакуации пораженных ФОВ. Преимуществом ингаляционной доставки служит возможность применения средств купирования бронхообструктивного синдрома и острого респираторного дистресс-синдрома, которые в полной мере не устраняются парентеральным назначением атропина пораженным тяжелой степени [9].

В 2010 г. В США была завершена первая фаза клинического исследования атропина сульфата в MicroDose, а также сравнительное изучение его фармакокинетики при ингаляционном и внутримышечном введении при помощи ИА «AtroPen». Установлена высокая биодоступность (85%) атропина после его ингаляционного введения и сопоставимость фармакокинетических параметров с внутримышечным введением препарата [4].

Перспективы ингаляционного введения лекарственных средств подтверждены в нашей стране результатами создания комбинированного препарата для коррекции нарушений дыхания при отравлении пульмонотоксикантами и судорожными агентами (препарат «БИФ» — капсулы с сухим порошком для ингаляций), а также научно-изыскательскими работами по макетированию универсального дозированного порошкового ингалятора для догоспитального этапа медицинской помощи.

Вакцинное направление. В настоящее время Российская Федерация располагает большим научно-практическим заделом в области групповой аэрозольной иммунизации. Так, еще в СССР были разработаны и рекомендованы для приме-

нения аэрогенные вакцины против брюшного тифа, паратифов, столбняка, чумы, туляремии и некоторых других заболеваний. В настоящее время в эндемичных районах реализованы технологии аэрозольной иммунизации против сибиреязвенной инфекции [1].

Неоспоримое преимущество аэрозольной вакцинации в групповом варианте состоит в возможности иммунизации в короткие сроки больших групп воинских контингентов и населения. При этом одной из нерешенных проблем групповой вакцинации остается неодинаковость дозирования вакцины, что может привести как к недостаточно напряженному иммунитету, так и к развитию реакций гиперчувствительности.

В этой связи объясним неослабевающий интерес зарубежных специалистов к рассмотрению варианта индивидуального применения ингаляционных вакцин [16]. В настоящее время на снабжении вооруженных сил стран НАТО вакцины в ингаляционной форме отсутствуют, но в сфере гражданского здравоохранения подобные вакцины находятся на разных стадиях разработки.

Проведены доклинические исследования ингаляционных вакцин от гриппа, от кори, живой ослабленной вакцины БЦЖ, вакцины на основе туберкулезного антигена, а также на основе дифтерийного антигена. Завершены клинические исследования в отношении следующих ингаляционных вакцин: от вируса кори, комбинированная от вирусов кори и краснухи, комбинированная от вирусов кори, краснухи и паротита, от вируса папилломы человека [16].

В настоящее время актуальна организация иммунизации ограниченных воинских контингентов перед отправкой в районы с неблагоприятной эпидемической обстановкой. В этих условиях вакцинирование с помощью индивидуальных ингаляторов может иметь преимущества перед групповой иммунизацией, поскольку оно обеспечивает более точное дозирование и отсутствие потерь активного начала, вызванных расходом вакцины на поддержание эффективных концентраций аэрозоля в воздухе.

Перспективные разработки в области создания новых форм МСЗ

Интраназальные формы. Интраназальный путь введения ЛС традиционно привлекает внимание исследователей при поиске альтернатив инъекционному введению при urgentных состояниях. Примечательно, что на снабжении вооруженных сил США находится вакцина против сезонного гриппа в ЛФ назального спрея 0,2 мл [13].

Интраназальное введение обладает следующими преимуществами: отсутствие эффекта первого прохождения через печень, удобство и легкость применения, быстрота развития системного эффекта по сравнению с пероральными формами, низкий риск передозировки, технологичность производства назальных спреев.

В числе перспективных направлений для применения интраназальных форм за рубежом рассматривают обезболивание в полевых условиях, а также профилактику нарушений операторской работоспособности пилотов в результате укачивания. Наибольший интерес представляет разработка противосудорожных препаратов на основе бензодиазепинов [10]. Мидазолам в дозах 2,5 мг или 5 мг в форме спрея для назального введения (Nazolam®) в 2017 г. был разрешен в Европе для клинического применения [14].

По результатам клинических исследований, мидазолам в форме раствора для интраназального введения (17 мг/мл) достигал максимальной концентрации в плазме крови (T_{max}) через 10–15 мин при абсолютной биодоступности 65–80%. При этом время наступления клинически значимых эффектов составляло 5–10 мин, а их продолжительность — 40 мин, что было сравнимо с внутривенным введением бензодиазепина [7].

Было установлено, что мидазолам и лоразепам при их интраназальном введении пациентам с эпилепсией обладали эффективностью, сопоставимой с парентеральным введением диазепам. Время, необходимое для купирования судорог, после интраназального применения мидазолама было меньше, чем в случае внутривенного введения диазепам, что способствовало уменьшению тяжести судорожного синдрома, а также уменьшению

объема терапии на этапе оказания врачебной помощи [17].

Результаты интраназального применения лоразепам у детей с пролонгированными судорогами показали, что бензодиазепин купировал судороги у 75% пациентов и снижал необходимость применения препаратов 2-й и 3-й линии противосудорожной терапии [17].

Применительно к практике военного здравоохранения можно предположить, что использование интраназальных форм бензодиазепинов на этапе само- и взаимопомощи будет связано со следующими преимуществами:

- быстрое достижение противосудорожного эффекта при отсутствии необходимости применения инъекционных средств;

- отсутствие необходимости привлечения квалифицированного медицинского персонала;

- уменьшение объема лечебных манипуляций на последующих этапах оказания медицинской помощи.

В настоящее время в качестве препарата выбора среди бензодиазепинов для создания интраназально форм находит применение мидазолам ввиду его быстрой фармакокинетики. Лоразепам, обладающий продолжительным действием, пригоден для создания пролонгированных форм.

Ингаляционные формы. Среди перспективных препаратов для ингаляционного применения за рубежом рассматриваются комплексоны радиоактивных аэрозолей. Возможность доставки хелатирующего агента непосредственно в альвеолы (примером чего служит *диэтилтриа-минпентауксусная кислота* — ДТПА) привлекает внимание исследователей потенциально более высоким местным эффектом (по сравнению с системным введением) и эффективностью декорпорации радионуклидов [12]. При этом ингаляционное введение ДТПА не исключает необходимости его внутривенного введения в последующем, однако в условиях отсутствия квалифицированного медицинского персонала и внутривенного доступа позволяет начать лечение в режиме само- и взаимопомощи. Работы в этом направлении актуализированы в связи с необходимостью оказания помощи при мас-

совом поступлении пострадавших. Так, за рубежом помимо существующих форм Са-ДТПА (растворы для ингаляции при помощи небулайзера и для внутривенного введения), проведены разработки комплексонов в форме сухого порошка для ингаляции [6]. Результаты исследований этих форм указывают на высокую эффективность и возможность практического использования в схемах оказания помощи на догоспитальном этапе.

Следует отметить, что в России существует научно-практический задел в области ингаляционных форм комплексобразователей радиоактивных аэрозолей. В частности, препарат «Пентацин» в форме раствора для внутривенного введения и ингаляций производится НПЦ «Фармзащита».

Лекарственная форма пластырей. В настоящее время пластыри можно отнести скорее к перспективным формам, ввиду их отсутствия на медицинском снабжении Российской армии. За рубежом проведены работы по внедрению коммерческих образцов трансдермальных форм в систему оказания помощи раненым и пораженным. Результаты клинических исследований пластырей со скополamiном для предупреждения нарушений операторской работоспособности при морской и воздушной болезни указывают на высокую эффективность такого способа доставки и снижение побочных М-холинергических эффектов [5].

Среди трансдермальных форм анальгетиков, рассматриваемых в качестве замены парентеральных, наиболее близки к практическому применению пластыри с фентанилом [15].

При рассмотрении перспективы применения МСЗ в форме пластыря следует учесть возможность их использования для профилактики нарушений работоспособности военнослужащих при укачивании, что актуально для ВКС и ВМС РФ.

Патч-помпа. Потенциальной формой для применения МСЗ, не представленной в настоящее время в руководствах по медицинскому обеспечению армий зарубежных стран, являются портативные помпы для подкожного введения ЛС (патч-помпы). Они представляют собой компактные устройства, закреп-

ляемые самостоятельно на коже при помощи адгезионной подложки, при этом объем инфузии может составлять 3–5 мл, а ее продолжительность 3–7 сут.

Наиболее целесообразным применение патч-помпы становится при необходимости пролонгированного введения МСЗ (для коррекции состояний, имеющих растянутую во времени динамику развития симптомов) без участия медицинского персонала, например при медицинской транспортировке. К числу потенциальных лекарственных средств для снаряжения патч-помпы можно отнести синтетические опиоидные анальгетики (пролонгированное обезболивание), гормональные факторы роста системы кроветворения, препараты глюкокортикоидных гормонов.

Перспектива применения таких устройств связана с совершенствованием подходов к повышению умственной и физической работоспособности, коррекции гипоксии и для иных состояний, при которых показания для введения МСЗ могут быть определены автоматически с помощью накожных датчиков физиологического состояния организма.

Буккальные формы. Актуальность исследований по совершенствованию буккальных ЛФ продиктована необходимостью поиска альтернатив инъекционному введению обезболивающих средств в условиях боевых действий или чрезвычайных ситуаций [10].

Наиболее вероятным кандидатом для трансбуккальных форм обезболивающего препарата для применения в полевых условиях считают фентанил, который в виде таблеток для рассасывания прошел успешную апробацию в армиях стран НАТО при ранениях средней тяжести и планируется к постановке на снабжение в качестве замены ИА с морфином [2].

Помимо анальгетиков, в буккальной форме возможно введение противорвотных, седативных и противосудорожных средств, средств для повышения физической и умственной работоспособности, что делает указанную технологию востребованной для решения широкого спектра задач Минобороны и МинЧС при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе медицинской эвакуации и транспортировке раненых и пораженных.

Концепция развития комплекса ЛФ для применения МСЗ

Проведенный обзор существующих и перспективных форм для применения МСЗ указывает на отсутствие универсальной ЛФ для всего спектра актуальных для военного здравоохранения лекарственных средств. Очевидно, что внедрение новых ЛФ будет способствовать наиболее полному оснащению передовых этапов медицинской эвакуации МСЗ и в итоге повышению качества оказания медицинской помощи.

На настоящий момент в ВС РФ для этих целей доступны таблетированные формы и формы в шприц-тюбике, которые отражают современный этап развития МСЗ. Препараты в указанных формах вводят профилактически или в кратчайшие сроки после поражения, при этом время достижения максимальной терапевтической концентрации ($T_{\text{макс}}$) лекарственных средств составляет 15–30 мин для шприц-тюбиков и 30–60 мин — для таблеток.

В пероральных формах (существующих и перспективных) наиболее целесообразно назначение обезболивающих средств, антибиотиков, средств купирования первичной реакции на облучение, радиопротекторов. В инъекционных формах обосновано применение антидотов ОВ, биоскавенджеров и биокатализаторов ФОВ.

Продолжительность эффекта в случае применения этих форм отчасти зависит от природы активного начала, но фармакокинетические особенности способа применения определяют длительность сохранения терапевтической концентрации в плазме крови не более 4–8 ч.

При определении ближайшей перспективы развития ЛФ отечественных МСЗ целесообразно рассмотреть ИА, буккальные формы, интраназальные формы и ингаляторы, патч-помпы и лекарственные пластыри. Отнесение этих форм (за исключением патч-помп) к ближайшей перспективе развития обосновано их наличием в арсенале медицинской службы армий стран НАТО.

Внедрение технологии ИА и их практическое использование стали следующим этапом после шприц-тюбиков. При сохранении основных медико-тактических характеристик основным техническим результатом от внедрения ИА мож-

но считать повышение удобства применения и расширение номенклатуры средств, доступных в инъекционной форме для введения в полевых условиях.

Примером развития пероральных форм на ближайшую перспективу можно назвать буккальные формы, которые являются альтернативой таблеткам и имеют преимущества с точки зрения «сглаженной фармакокинетики» и возможности применять нестабильные в желудочно-кишечном тракте препараты. По показателю $T_{\text{макс}}$ буккальные формы сопоставимы с инъекционными (15–30 мин).

Интраназальным формам в ближайшей перспективе развития МСЗ, по-видимому, отведена роль в системной доставке вакцин, и, возможно, противосудорожных препаратов первой линии терапии.

Формы для ингаляционного введения (портативные индивидуальные ингаляторы) в качестве МСЗ в настоящее время приняты на снабжении в вооруженных силах стран НАТО и могут рассматриваться как наиболее вероятные кандидаты для применения МСЗ в Российской Федерации в ближайшей перспективе. Результатом их внедрения может быть повышение удобства применения, эффективности средств, действующих на органы дыхания и центральную нервную систему. Кроме того, как ингаляционные, так и интраназальные формы характеризуются высокой скоростью наступления эффекта ($T_{\text{макс}}$ 5–15 и 10–15 мин соответственно).

Группа форм МСЗ, которые потенциально могут быть применены в отсроченный период после поражения (или профилактически) для длительного поддержания фармакологического эффекта, представлена лекарственными пластырями и патч-помпами. Внедрение этих форм в качестве МСЗ позволяет исключить необходимость нескольких инъекций и наблюдения медицинского персонала, а также обеспечить поддержание фармакологического эффекта в процессе медицинской эвакуации. Перечень препаратов, применение которых целесообразно в составе патч-помп и пластырей, может включать обезболивающие препараты, средства купирования первичной реакции на облучение, радиомитигаторы, средства лечения токсического отека легких, повышения работоспособности и

сохранения операторской работоспособности при укушении

В среднесрочной перспективе развития перечисленных форм можно предположить появление:

- ингаляторов на новых принципах (например, на пьезокристаллах или с использованием портативных парогенераторов);
- нательных инъекторов (инфузоматов), реагирующих на изменение физиологического состояния организма;
- пластырей, активируемых при изменении физиологического состояния организма.

Проведенный анализ показал, что на современном этапе развития МСЗ лекарственных формы становятся самостоятельным фактором, определяющим их

медико-тактические характеристики, в первую очередь – скорость достижения и длительность поддержания защитного эффекта. Важным аспектом при оценке возможности применения МСЗ в тех или иных технических устройствах или ЛФ является характеристика их технологичности и готовности отечественной производственной базы к их серийному производству и государственной регистрации в качестве лекарственных препаратов или изделий медицинского применения.

В качестве начального этапа модернизации перспективна разработка, совершенствование и внедрение ингаляционных и интраназальных форм для использования на догоспитальном этапе медицинской помощи.

Литература

1. Шустиков В.М. Исследование по разработке аэрозольного метода иммунизации людей против сибирской язвы: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1992.
2. Aldington D., Jagdish S. The fentanyl «lozenge» story: from books to battlefield // J. R. Army Med. Corps. – 2014. – Vol. 160, N 2. – P. 102–104.
3. Blankenstein T.N., Gibson L.M., Claydon M.A. Is intramuscular morphine satisfying frontline medical personnels' requirement for battlefield analgesia in Helmand Province, Afghanistan? A questionnaire study // Br. J. Pain. – 2015. – Vol. 9, N 2. – P. 115–121.
4. Corcoran T.E., Venkataramanan R., Hoffman R.M. et al. Systemic Delivery of Atropine Sulfate by the MicroDose Dry-Powder Inhaler // J. Aerosol. Med. Pulm. Drug Deliv. – 2013. – Vol. 26, N 1. – P. 46–55.
5. Gil A., Nachum Z. A comparison of cinarizine and transdermal scopolamine for the prevention of seasickness in naval crew: a double-blind, randomized, crossover study // Clin. Neuropharmacol. – 2012. – Vol. 35, N 1. – P. 37–39.
6. Gremy O., Tsapis N., Chau Q. et al. Preferential decorporation of americium by pulmonary administration of DTPA dry powder after inhalation of aged PuO₂ containing americium in rats // Radiat. Res. – 2010. – Vol. 174, N 5. – P. 217–223.
7. Loftsson T., Gudmundsdottir H., Sigurjynsdottir J.F. et al. Cyclodextrin solubilization of benzodiazepines: formulation of midazolam nasal spray // Int. J. Pharm. – 2001. – Vol. 212, N 1. – P. 29–40.
8. Meridian Medical Technologies Official Site – Products. URL: <http://www.meridianmeds.com/products> (дата обращения: 16.02.2019).
9. MicroDose completes atropine inhaler Phase I study on nerve agent poisoning. URL:

<https://www.news-medical.net/> (дата обращения: 16.02.2019).

10. Military Advanced Regional Anesthesia and Analgesia Handbook. – Houston: Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center. – 2008. – P. 154.
11. Multiservice Tactics, Techniques and Procedures for Treatment of Chemical Agent Casualties and Conventional Military Chemical Injuries. URL: <https://fas.org/irp/doddir/army/atp4-02-85.pdf> (дата обращения: 16.02.2019).
12. Peron N., Le Guen P., Andrieu V. et al. Inhalation therapy: inhaled generics, inhaled antidotes, the future of anti-infectives and the indications of inhaled pentamidine // Rev. Mal. Respir. – 2013. – Vol. 30. – P. 832–842.
13. Sanchez J.L., Cooper M.J., Myers C.A. et al. Respiratory Infections in the US Military: Recent Experience and Control // Clin. Microbiol. Rev. – 2015. – Vol. 28. – P. 743–800.
14. Schrier L., Zuiker R., Merkus F.W. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a new highly concentrated intranasal midazolam formulation for conscious sedation // Br. J. Clin. Pharmacol. – 2017. – Vol. 83, N 4. – P. 721–731.
15. Schug S.A., Ting S. Fentanyl Formulations in the Management of Pain: An Update // Drugs. – 2017. – Vol. 77, N 7. – P. 747–763.
16. Tonniss W., Kersten G., Frijlink H. et al. Pulmonary Vaccine Delivery: A Realistic Approach? // Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery. – 2012. – Vol. 25, N 5. – P. 249–260.
17. Wermeling D.P. Intranasal delivery of antiepileptic medications for treatment of seizures // Neurotherapeutics. – 2009. – Vol. 6. – P. 50–51.
18. Ziemba R. Use of individual auto-injector kits «IZAS-05» on the contemporary battlefield // Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research. – 2012. – Vol. 18, N 1. – P. SR1–SR8.