

4. *Bakunowicz-Lazarczyk A.* Comparative studies of morphological changes and interleukin concentration in subretinal fluid of patients with retinal detachment / A. Bakunowicz-Lazarczyk, S. Sulkowski, T. Moniuszko // *Ophthalmologica*. — 1999 — Vol. 213. — P. 25—29.

5. *Cook B.* Apoptotic photoreceptor degeneration in experimental retinal detachment / B. Cook, G. P. Lewis, S. K. Fisher, R. Adler // *Investigative Ophthalmology & Visual Science* — 1995 — Vol. 36 — P.990-996.

6. *Custodis E.* Bedeutet die Plombenaufnahme und die Skleraeinen Fortschritt in der operativeen Behandlung der Netzhautblösung // *Ber. Dtsch. Ophthal. Ges.* — 1953. — Vol. 58. — S. 102—105.

7. *Gonin J.* Le traitement operatoire du décollement rétinien. Conference aux journées médicales de Bruxelles // *Bruxelles—Medical*. — 1930. — Vol. 23. — P. 17—24.

8. *Hisatomi T.* Relocalization of Apoptosis-Inducing Factor in Photoreceptor Apoptosis Induced by Retinal Detachment in

Vivo / T. Hisatomi, T. Sakamoto, T. Murata, I. Yamanaka, Y. Oshima, Y. Hata, T. Ishibashi, H. Inomata, S. A. Susin, G. Kroemer // *Am. J. Pathol.* — 2001. — Vol. 158. — P. 1271—1278.

9. *O'Connor P.R.* External buckling without drainage for selected detachments in aphakic eyes // *Am. J. Ophthalmol.* — 1976. — Vol. 82. — P. 358—364.

10. *Su C.Y.* Concentration of vascular endothelial growth factor in the subretinal fluid of retinal detachment / C. Y. Su, M. T. Chen, W. S. Wu, W. C. Wu // *J. Ocul. Pharmacol. Ther.* — 2000. — Vol. 16. — P. 463—469.

## Контактная информация

**Балашевич Леонид Иосифович** — д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор СПб филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова, e-mail: Leonid.Balashевич@spbmapo.ru

УДК 616.89-008.441.13

## ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ ЛИЦАМ В ОЦЕНКАХ ИХ РОДСТВЕННИКОВ

**С. А. Вешнева**

*Правобережная больница ФГУ «Южный окружной медицинский центр  
Федерального медико-биологического агентства России», Астрахань*

Анкетирование 328 родственников пациентов наркологического профиля показало, что медицинские учреждения рассматриваются ими в качестве основных агентов ресоциализации близких им людей, хотя деятельность данных структур недостаточно эффективна. Помощь со стороны религиозных и общественных организаций, при несомненной ее востребованности, получает значительно меньшее количество наркозависимых лиц.

*Ключевые слова:* родственники пациентов наркологического профиля, лечебно-реабилитационная помощь, анкетирование.

## THE EVALUATION OF TREATMENT AND REHABILITATION OF DRUG-ADDICTS BY THEIR RELATIVES

**S. A. Veshneva**

The questionnaire survey of 328 relatives of drug-addicted patients revealed that healthcare providers were considered as main agents of resocialization by them. However, their work was not found to be effective enough. A considerably fewer part of drug-addicts were provided with assistance from religious and social organizations despite the fact that they badly need it.

*Key words:* relatives of drug-addicted patients, treatment and rehabilitation, questionnaire survey.

Характерной особенностью отечественной медицины последних десятилетий являются многочисленные концептуальные изменения, затрагивающие не только отдельные специальности, но и «общие подходы» в данной области знаний. В частности, врачи лишились монопольного права на оценку качества лечебно-реабилитационного процесса, а мнение пациентов и даже их родственников приобретает все большее значение [2, 4, 5, 8—10], что в полной мере относится и к наркологии [1, 3, 4, 6, 7].

### ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выяснить мнение родственников пациентов наркологического профиля о роли медицинских учреждений,

религиозных и общественных организаций в оказании лечебно-реабилитационной помощи близким им людям.

### МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

С помощью специально разработанной анкеты в наркологических и психоневрологических учреждениях городов Астрахани и Волгограда было проведено анкетирование 328 родственников пациентов наркологического профиля (сплошные гнездовые выборки).

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Только половина родственников пациентов наркологического профиля (52,4 %) считала эффективной

оказание в настоящее время лечебно-реабилитационной помощи зависимым людям; четвертая часть (24,7 %) оценила ее как недостаточно эффективную и каждый восьмой (11,9 %) — как крайне неэффективную, остальные 11,0 % затруднились ответить на данный вопрос. 50,6 % респондентов ответили, что медицинские организации/учреждения много помогли/помогают близкому им человеку, 27,4 % — что ограниченно помогли/помогают, 11,9 % — что практически не помогли/не помогают и 10,1 % затруднились ответить. В целом приведенные оценки родственников свидетельствуют о недостаточно эффективном функционировании в данном направлении специализированных учреждений медицинской направленности (наркологических и психиатрических учреждений, а также различных центров реабилитации, призванных, в первую очередь, оказывать помощь данному контингенту пациентов).

21,3 % респондентов ответили, что общественные организации много помогли/помогают близкому им человеку (относительно религиозных организаций так ответили 26,2 %, 22,6 % (29,9 %) — что ограниченно помогли/помогают, 32,6 % (25,0 %) — что практически не помогли/не помогают и 23,5 и 23,5 % соответственно затруднились ответить.

Представляется, что, обобщенно ответы родственников наркозависимых лиц можно интерпретировать следующим образом:

— религиозные и общественные организации помогают наркозависимым людям;

— хотя помощь со стороны института религии респонденты и оценивают более положительно, чем помощь общественных организаций, но эти различия не носят принципиального характера;

— «вклад» в реабилитацию наркозависимых лиц со стороны религиозных и общественных организаций значительно меньше «вклада» медицинских учреждений.

В контексте вышеизложенного представляется понятным отношение родственников зависимых лиц к тому, что при наличии выраженной зависимости (то есть наличия диагноза алкоголизма, наркомании, токсикомании) основную роль в лечебно-реабилитационном процессе должны играть медицинские учреждения (и работающие там специалисты). С данным подходом полностью согласились 63,7 % респондентов; еще 22,6 % частично согласились, совершенно не согласными были всего 8,8 %, остальные 4,9 % затруднились ответить.

38,7 % респондентов полностью согласились также и с утверждением, что в настоящее время в обществе сложилось неоправданно негативное отношение к зависимым людям; столько же (38,7 %) частично согласились; 20,1 % были совершенно не согласны с этим и остальные 2,5 % затруднились ответить. Таким образом, ответы опрошенных относительно стигматизационных проявлений в отношении данной категории лиц свидетельствуют не просто о том, что данное социальное явление (стигматизация) встречается, а о том, что оно встречается достаточно часто.

Среди мероприятий по улучшению помощи зависимым людям респонденты чаще всего называли улучшение профилактической работы, особенно среди детей и подростков (62,5 %), и более широкое участие психологов и специалистов по социальной работе в лечебно-реабилитационной и профилактической деятельности (61,3 %). Далее шли пожелания, касающиеся оптимизации тех или иных сторон функционирования собственно медицинских учреждений: улучшить медикаментозную помощь (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) — его высказали 50,3 %; повысить доступность оказания наркологической помощи (38,7 %) и улучшить подготовку сотрудников психоневрологических / наркологических учреждений (37,8 %). В трети анкет отмечалась целесообразность более широкого участия как представителей общественных организаций в лечебно-реабилитационной и профилактической деятельности (35,1 %), так и представителей религиозных организаций (33,8 %). Еще 31,4 % опрошенных высказались об улучшении этического правового обеспечения наркологической службы. Резюмируя ответы родственников пациентов наркологического профиля на данный вопрос анкеты, можно констатировать достаточно большое количество претензий/пожеланий к организации реабилитации наркозависимых лиц (один респондент, в среднем, высказал 3,6 пожелания, что свидетельствует о многочисленных проблемах, стоящих перед наркологией). Косвенно это подтверждается и оценками эффективности оказания в настоящее время лечебно-реабилитационной помощи зависимым людям: как отмечалось выше, только половина опрошенных (52,4 %) считали, что она оказывается достаточно эффективно, а 36,6 % отрицали это, причем 11,9 % ответили, что она оказывается «крайне не эффективно».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что именно медицинские учреждения родственники пациентов наркологического профиля рассматривают в качестве основных агентов ресоциализации своих близких людей, хотя и отмечают недостатки в деятельности данных структур (проблемы с оказанием медикаментозной помощи, недостаточно высокую квалификацию сотрудников, трудности получения наркологической помощи, недостаточно активное участие в реабилитационном процессе медицинских психологов и специалистов по социальной работе). При несомненной востребованности помощи со стороны религиозных и общественных организаций получает значительно меньшее количество наркозависимых лиц.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Богданов С. И. Организация лечения больных наркоманией: оценка потребителей наркотиков / С. И. Богданов, Е. Н. Чадова, К. Ю. Ретюнский, А. С. Огдов, Л. В. Винс, С. С. Богданова // Наркология. — 2012. — Т. 11, № 1 (121). — С. 16—22.

2. Былим И. А., Любов Е. Б. Пациенты и их близкие: оценка качества психиатрической помощи // Психическое здоровье. — 2010. — № 8. — С. 56—71.

3. Городнова М. Ю. Эффективность наркологического лечения глазами специалиста и пациента // Наркология. — 2014. — Т. 13, № 5 (149). — С. 75—78.

4. Деларю В. В. Вопросы психиатрии, наркологии и неврологии в диссертационных исследованиях по социологии медицины // Обзорение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. — 2013. — № 3. — С. 78—80.

5. Деларю В. В. Психотерапевтическая помощь в оценках ее потребителей / В. В. Деларю, А. А. Горбунов, С. А. Юдин // Вестник психотерапии. — 2012. — № 42 (47). — С. 20—25.

6. Елецкая М. А. Особенности восприятия заболевания и методов лечения больными алкогольной зависимостью и их родственниками / М. А. Елецкая, Д. В. Шлеин, Н. Л. Солодовникова // Наркология. — 2014. — Т. 13, № 9 (153). — С. 33—43.

7. Менделевич В. Д. Социологическая оценка барьеров доступности получения медицинской помощи жен-

щинами, употребляющими наркотики инъекционно // Наркология. — 2012. — Т. 11, № 8 (128). — С. 81—86.

8. Оруджев Н. Я., Поплавская О. В. Актуальные проблемы современной психиатрии // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. — 2013. — № 4 (48). — С. 8—11.

9. Солохина Т. А. Участие родственников психически больных в оценке качества психиатрической помощи и ее совершенствовании // Психиатрия. — 2004. — № 2 (8). — С. 36—41.

10. Юдин С. А. Проблема комплаентности во фтизиатрии: позиции врачей и пациентов диаметрально противоположны / С. А. Юдин, В. В. Деларю, А. С. Борзенко // Социология медицины. — 2014. — № 1 (24). — С. 19—21.

## Контактная информация

**Вешнева Светлана Александровна** — к. м. н., главный врач, Правобережная больница ФГУ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России», e-mail: veshneva@mail.ru

УДК 616.13-004.6:616.127-005.8

## МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИППОКАМПА ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ В СОЧЕТАНИИ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

**Е. В. Горелик, А. В. Смирнов, А. И. Краюшкин, Н. В. Григорьева**

*Волгоградский государственный медицинский университет,  
кафедра патологической анатомии, кафедра анатомии человека,  
Волгоградский медицинский научный центр*

Проведен анализ патоморфологических изменений в гиппокампе у лиц второго периода зрелого возраста. Патологоанатомическое исследование показало, что все умершие имели патологию сосудов головного мозга. Изменения, характерные для ранних стадий атеросклероза, были обнаружены в базиллярной и средних мозговых артериях. При микроскопическом исследовании были обнаружены выраженные структурные признаки повреждения нейронов пирамидного слоя в зонах CA1 и CA3.

*Ключевые слова:* гиппокамп, церебральный атеросклероз.

## MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE HIPPOCAMPUS IN CEREBRAL ATHEROSCLEROSIS ASSOCIATED WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

**E. V. Gorelik, A. V. Smirnov, A. I. Krayushkin, N. V. Grigoreva**

Pathomorphological changes in the hippocampus in middle-aged males were analyzed. Postmortem examination showed that all the dead had a pathology of brain vessels. Early atherosclerotic changes were found in the basilar and middle cerebral arteries. During a microscopic examination marked structural features of neuronal damage in the pyramidal layer in CA1 and CA3 areas were revealed.

*Key words:* hippocampus, cerebral atherosclerosis.

Социальная значимость цереброваскулярных болезней возрастает в связи с увеличением числа лиц с факторами риска развития сердечно-сосудистой патологии [4]. Цереброваскулярная болезнь (ЦВБ) — поражение сосудов головного мозга, приводящее к хроническому кислородному голоданию мозга и, как следствие, нарушению его функций. Основной причиной

заболевания является поражение артерий головного мозга при атеросклерозе, гипертонической болезни или вторичных артериальных гипертензиях, приводящее к сужению просвета и снижению мозгового кровотока. Доля нарушений кровообращения головного мозга, возникающих при врожденных аномалиях мозговых сосудов, васкулитах, токсических поражениях сосудов