ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ В КЛИНИКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬНЕОПЕЛОИДОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ

УДК 614

Г.В. Сидорова¹, Н.А. Батаева², Н.И. Арсентьева¹, Е.С. Шигаев³¹НЦРВХ СО РАМН (Иркутск)²Климатобальнеогрязевой курорт «Горячинск» (Горячинск)³Бурятский филиал НЦРВХ СО РАМН (Улан-Удэ)

Высокая частота заболеваний опорно-двигательного аппарата (от 88 до 220,3 пациентов на 1000 осмотренных), тяжелые функциональные нарушения, длительная временная и стойкая утрата трудоспособности определяют значительный социально-экономический ущерб, наносимый ими обществу [1, 2, 3].

Низкая эффективность консервативных мероприятий с последующей непродолжительной ремиссией привели к тому, что хирургический метод лечения повреждений и заболеваний крупных суставов [4] и реабилитация данной категории больных [5, 6, 7, 8] стали ведущими вопросами.

Цель исследования: повысить эффективность восстановительного лечения больных остеоартрозом путем комплексного применения бальнеопелоидотерапии и разгрузочной диеты.

Материалы и методы исследования.

Характеристика курорта Горячинск

Основными природными лечебными факторами бальнеологического курорта Горячинск, расположенного на восточном берегу озера Байкал являются азотно-кремнистая, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая минеральная вода и слабосульфидные сапропелевые лечебные грязи [9].

Горячинская природная минеральная термальна вода (МВ) оказывает благоприятное воздействие на обменные процессы, метаболизм хряща, периферическую гемодинамику и микроциркуляцию, на действие нейрогормональной системы, функцию нервно-мышечного аппарата. «Горячинская» МВ чрезвычайно богата азотом; кроме того, содержит редкие газы (аргон, криптон, ксенон, неон, гелий), микроэлементы (медь, титан, молибден, литий, серебро). Вследствие присутствия H_2SiO_3 минеральная вода оказывает антиоксидантное действие, усиливает рост костей, волос, благоприятна в лечении пожилых людей с нарушениями обменных процессов [10].

Для грязелечения используются сапропели озера Бармашовое, расположенного в 85 км к северу от курорта «Горячинск». Грязь данного типа (содержание сульфидов до 0,12%, зольность 66,7%; теплоемкость 0,9 кал/град; РН 7,8; минерализация грязевого раствора более 1,8 г/дм³) обладает высокой влаго- и теплоемкостью, относительно низкой теплопроводностью. Сапропели оказывают противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое, улучшающее трофику и кровообращение действие.

В настоящее время в санатории функционирует 375 коек. Всего в течение 2008 года на курорте пролечено 4127 пациентов, из них 2233 (54%) – пациенты с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата.

Используемые компоненты лечебного комплекса для данных пациентов: режим, диета, климатолечение, бальнео- и пелоидотерапия, физиотерапия, ЛФК, массаж, иглорефлексо- и фитотерапия, медикаменты.

Из методов диагностики применялись:

1) лучевые (рентгенография с определением ширины суставной щели в верхнелатеральном отделе сустава и оценкой тяжести поражений субхондральных отделов сочленяющихся костей);

2) функциональные

– реовазография (РВГ) с выявлением нарушений регионарной гемодинамики;

– ультразвуковая доплерография (УЗДГ) с определением диаметра и площади сечения бедренных артерий и вен, линейной и объемной скорости кровотока в них;

– гониометрия (ГМ) с оценкой объема движений в суставах;

– электромиография (ЭМГ) с определением тонуса мышц нижних конечностей.

3) лабораторные (анализ неспецифической адаптационной реактивности по Л.Х. Гаркави).

4) клинические.

Под нашим наблюдением находилось 45 пациентов, средний возраст которых составил $56,24 \pm 0,51$ год. Из них 82,9% – женщины, 17,1% – мужчины, страдающие остеоартрозом в среднем $10,7 \pm 1,4$ года. Первичный остеоартроз выявлен у 85,2% пациентов, у 14,8% – остеоартроз имел вторичный характер. Преимущественно страдал тазобедренный сустав.

По результатам рентгенологических обследований у 31,8% из них выявлена I стадия суставного процесса по классификации Kellgren и Lawrence, у 78,2% – вторая стадия.

Основным клиническим проявлением у всех пациентов была боль, интенсивность которой оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), по индексу Лекена, индексу остеоартрита WOMAC до и после реабилитации.

Выраженные нарушения функции суставов (ФНС II) выявлены у 17,5% пациентов, умеренные (ФНС I) – у 43,3%; отсутствовали (ФНС 0) – у 49,0%.

Постоянно принимали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) до лечения на курорте 18 человек, остальные эпизодически при возникновении боли.

В лечебный комплекс пациентов основной группы (23 человека) помимо диеты, выбор которой осуществлялся с учетом сопутствующей патологии и индивидуальной или групповой лечебной физкультуры, были включены грязевые аппликации на пораженные суставы нижних конечностей и бальнеотерапия. Разгрузочно-диетическая терапия проводилась по методике полного воздержания от пищи без ограничения потребления воды в течение 10 дней, в восстановительный период – 10–11 дней, пациенты питались по специально разработанной диете с постепенным наращиванием рациона по белкам, жирам, углеводам и объему съеданной пищи (Методические рекомендации по дифференцированному применению разгрузочно-диетической терапии при некоторых внутренних и психо-соматических заболеваниях для врачей терапевтов, диетологов, невропатологов и психиатров с правом переиздания органами здравоохранения / М.А. Самсонов, Ю.С. Николаев, А.Н. Кокосов и др. – М., 1990 – 31 с.).

Лица контрольной группы (22 человека) получали аналогичную бальнеотерапию. По полу и возрасту значимых отличий от основной группы не было.

Пациенты обеих групп в целом хорошо переносили назначенное лечение, но побочные эффекты бальнеореакции в основной группе встречались в три раза реже, чем в контрольной (8,3% и 27,4% соответственно).

Результаты и их обсуждение

Сравнительный анализ динамики субъективных и объективных симптомов основного заболевания выявил наличие четко позитивных тенденций у подавляющего числа пациентов обеих групп. Однако более выраженной эта динамика была у лиц первой группы.

Особенно важным на наш взгляд, является факт уменьшения в результате проводимой терапии числа пациентов, имеющих клинические проявления реактивного синовита, более значимое в основной группе (с 53,6% до 25% – в 2, 1 раза, в группе контроля с 42,9% до 35,7% – в 1,2 раза), а

также увеличение объема движений в пораженных суставах у больных первой группы (в группе сравнения динамика выраженности симптома заболевания была статистически недостоверна) (табл. 1, 2).

Таблица 1. Динамика клинических показателей у больных коксартрозом в результате лечения

Исследуемый показатель	Группа наблюдения					
	Основная группа		P	Контрольная группа		P
	До лечения	После лечения		До лечения	После лечения	
Счет боли (индекс Лекена), баллы	11,6±0,6	5,9±0,3	<0,001	11,6±0,4	6,1±0,3	<0,001
Амплитуда движений в суставах, угловые градусы	101,2±9,81	115,4±9,3	<0,01	99,1±9,8	101,3±8,6	<0,05
Гипотрофия мышц бедра, см	1,09±0,17	0,75±0,12	<0,01	1,08±0,12	0,93±0,13	>0,05
Легкая хромота, баллы	0,87±0,09	0,51±0,02	<0,01	1,03±0,12	0,88±0,02	<0,05

Таблица 2. Результаты лечения больных коксартрозом

Группы наблюдений	Частота обострений			
	Через 6 мес.		Через 1 год	
	Абс.	%	Абс.	%
Основная группа	3	13,0	5	20,7
Контрольная группа	4	18,1	6	27,2

Уменьшение болевого синдрома в среднем наступало в основной группе к 3–4-й процедуре, тогда как в контрольной – к 8–9-й; ограничение амплитуды движений составляло в основной группе 0 баллов, в контрольной – 2 балла.

При проведении катamnестического анализа в сроки 6 месяцев и 1 год после лечения установлена более низкая частота обострений у больных, получавших комплексное лечение + диета (табл. 2). В основной группе средние сроки лечения составляли 3,5–4,0 недели, в то время как в контрольной – 1,5–2 месяца.

После курса лечения исчезновение болей отмечали 18,2% больных контрольной группы и 82,5% – основной; уменьшение интенсивности болей 17,4% и 68,2% соответственно. Дали оценку «без изменений» или «усиление болей» – 13,6% пациентов контрольной группы, что было связано с бальнеореакцией и потребовало увеличение дозы НПВП. Таких случаев в основной группе не было. Ограничение движений в суставах уменьшилось на 75,0% и 54,5% соответственно группам наблюдения.

По окончании реабилитации (табл. 1) у больных 1 группе ГМ показала достоверное увеличение объема движений в поврежденном суставе.

Наряду с регрессом патологических изменений, выявленных с помощью специальных методов исследования в соответствии с представленным алгоритмом, у больных уменьшилась выраженность болевого синдрома и повысилась функциональная активность. При ВАШ-тестировании у больных 1 группы отметили снижение боли с 61±2,9 до 34±1,9 мм (p<0,0001), у больных 2 группы – с 64±2,2 до 38±1,3 мм (p<0,0001).

При оценке функционального состояния с помощью индекса остеоартрита WOMAC выявили достоверные снижения основных проявлений остеоартроза. Уровень боли снизился в 1 группе с 351±12,4 до 203±8,4 мм (p<0,0001), во второй с 329±9,5 до 205±7,1 мм (p<0,0001). Снизилась скованность в суставах с 69±5,1 мм до 36±3,1 мм (p<0,001) в первой группе, с 58±2,9 до 33±1,6 мм (p<0,0001) во второй. Соответственно уменьшились значения функциональных нарушений: в 1 группе с 1117±34,2 до 680±24,5 мм (p<0,0001), во 2-й с 1075±25,6 до 647±19,3 (p<0,0001). Суммарный показатель WOMAC: в 1 группе с 1540±34,3 до 1132±26,7 мм (p<0,0001), во 2-й с 1587±26,5 до 940±20,7 мм (p<0,0001). Использование в качестве критерия оценки результатов индекса Лекена показало уменьшение его значений в 1-й группе с 11,6±0,6 до 5,9±0,3 балла (p<0,0001), во 2-й с 11,6±0,4 до 6,1±0,3 балла (p<0,0001).

Более выраженное улучшение в основной группе подтверждается анализом неспецифической адаптационной реактивности по Л.Х. Гаркави [11]. В основной группе высокого уровня реактивности (тренировки и спокойной активации) к концу курса лечения возросли на 52,2%, а в контрольной – на 36,4% случаев. Реакция стресса наблюдалась только в контрольной группе у 9,1% больных (p<0,05).

По мнению Л.Х. Гаркави с соавт. [12], данная ситуация свидетельствует об уравновешенности расхода и накопления энергии, способствующих гармонизации деятельности систем организма, обеспечивающих быстрое восстановление его резервов.

Изучение состояния микроциркуляции в зоне пораженных суставов после лечения обнаружило, что комплексное восстановительное лечение больных остеоартрозом с использованием диет-, пелоидо- и бальнеотерапии более значимо (по сравнению с группой контроля) нормализует расстройство капиллярного кровотока и сопряженных изменений в микрососудах артериолярного и веноулярного звеньев микроциркуляторного русла за счет, вероятно, улучшения активных механизмов регуляции микроциркуляции (эндотелиального, нейрогенного, миогенного), а также оптимизации приспособительных механизмов пропускной способности микрососудистой сети путем использования резервных возможностей артериального отдела капилляров (шунтов), что приводит к повышению транспорта кислорода, увеличению доставки энергетических и пластических материалов, гормонов и микроэлементов к клеткам, а, следовательно, улучшению трофики суставных тканей и замедлению прогресса патологического очага.

Анализ динамики электромиографических показателей у пациентов основной группы после курсового воздействия диетобальнеопелоидотерапии выявил повышение исходно сниженного тонуса мышц нижних конечностей, в частности прямых мышц бедер, что является важным фактором коррекции осевых установок, соответствующих здоровым суставам, и как следствие, защиты патологически измененных суставов конечностей от прогрессирующей деструкции. В частности, у пациентов с исходной низкоамплитудной электромиограммой mm. rectus femoris выявлено увеличение амплитуды интерференционной кривой максимального произвольного усилия с 220,16±15,7 мкВ до 401,97±41,2 мкВ (p<0,001). У пациентов контрольной группы статистически значимых изменений параметров, характеризующих состояние нейрогенного аппарата нижних конечностей, не выявлено (608,0±31,06 мкВ до лечения и 558,39±42,75 мкВ после лечения).

Анализ отдаленных результатов лечения по данным анкетирования показал, что через год больные основной группы с остеоартрозом отметили эффект как положительный в 91,3% случаев. Из них 69,6% отметили значительные улучшения, 17,3% – улучшение, 4,4% – незначительное улучшение.

В контрольной группе лишь 77,3% оценили эффект как положительный, из них 31,8% отметили значительное улучшение, 36,4% – улучшение и 9,1% – незначительное улучшение.

Продолжительность улучшения до 1 года отметили 19 (82,6%) человек основной группы и 8 человек (36,4%) из группы сравнения. Частота обострений (через 12 мес.) была существенно выше в контрольной группе (табл. 2). К прежней дозе НПВП вернулась половина больных контрольной (22,7%) и лишь 4,4% из основной группы.

Таким образом, применение азотно-кремнистой бальнеотерапии и сульфидной пелоидотерапии на курорте Горячинск в лечении больных остеоартритом оказывает положительный эффект на клиническую картину, адаптационный статус и отдаленные результаты лечения. Сочетанное применение бальнеопелоидотерапии и разгрузочно-диетической терапии существенно улучшает результаты лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ударцев Е.Ю., Распопова Е.А. // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2009. - № 2. - С. 26-31.
2. Неверов В.А., Курбанов С.Х. // Вестник хирургии им. И.М. Грекова. - 2004. - Т. 163, № 2. - С. 97-99
3. Ackermann H. Akute und chronische Schmerzen: aktuelle strategien in der Schmerztherapie. New Isenburg. 2001. - 220 s.
4. 2. Зайцева О.П. Ошибки и осложнения эндопротезирования тазобедренного сустава: Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.м.н. - Курган, 2009. - 24 с.
5. Алексеева Л. И. // Качество жизни. Медицина. 2003. - № 3. - С. 34-38
6. Егорова Е.В., Шиман А.Г., Шатров А.В., Линник С.А. и др. // Травматология и ортопедия России. - 2009. - № 2 (52). - С. 73-75.
7. Курбатов С.Х. Индивидуальная реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава: Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.м.н. - СПб., 2009. - 38 с.
8. Неверов В.А., Климов А.В., Курбанов С.Х., Смирнова О.В. // Вестник хирургии им. И.М. Грекова. - 2006. - Т. 165, № 6. - С. 116-117
9. Курорт Горячинск <http://www.gor03.ru/goryachinsk/>
10. Техника и методики физиотерапевтических процедур: справочник / под ред. В.М. Богомолова. - Ржев, 2008. - 405 с.
11. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А.. Адаптационные реакции и резистентность организма. - Ростов-на-Дону. Изд. Ростовского университета, 1990. - 224 с.
12. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С. Антистрессорные реакции и активационная терапия. - М.: Имедис, 1998. - 656 с.

РЕЗЮМЕ

Применение азотно-кремнистой бальнеотерапии и сульфидной пелоидотерапии на курорте Горячинск в лечении больных остеоартритом оказывает положительный эффект на клиническую картину, адаптационный статус и отдаленные результаты лечения. Сочетанное применение бальнеопелоидотерапии и разгрузочно-диетической терапии существенно улучшает результаты лечения.

Ключевые слова: курорт Горячинск, остеоартроз, реабилитация

ABSTRACT

Use of nitrosiliceous balneotherapy and sulfide pelotherapy in Goryachinsk health resort in treatment of patients with osteoarthritis have positive effect on clinical finding, adaptation status and long-term effects. Combined use of balneopelotherapy and fasting-dietetic therapy makes the results of the treatment appreciably better.

Key words: Goryachinsk health resort, osteoarthritis, rehabilitation

Контакты

Сидорова Галина Викторовна, д.м.н., профессор, заместитель директора ИТО по науке. 664003 Иркутск, ул. Борцов Революции, 1. Тел. (3952) 29-03-38

Батаева Наталья Алексеевна, к.м.н. врач-терапевт курорта Горячинск, 671275, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск. +7(30144) 55-195

Арсентьева Наталия Ивановна, к.б.н., доцент, ученый секретарь НЦРВХ СО РАМН. 664003 Иркутск, ул. Борцов Революции, 1. Тел. (3952) 29-03-39. ars-nataliya@yandex.ru

Шигаев Евгений Станиславович, м.н.с. Бурятского филиала НЦРВХ СО РАМН. 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 12.

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

УДК 615.838.97.03:618.36-08.64

Баранников В.Г. - ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», заведующий кафедрой коммунальной гигиены и гигиены труда, д.м.н., профессор, e-mail: barannikov41@mail.ru

Кириченко Л.В. - ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», доцент кафедры коммунальной гигиены и гигиены труда, к.м.н., e-mail: lkv-7@yandex.ru

Сандакова Е.А. - ГОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава», заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации и последипломной переподготовки специалистов, д.м.н., профессор, e-mail: sandakova@mail.ru

Грехова И.А. - врач ультразвуковой диагностики Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7».

ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава»

Аннотация

В комплексной терапии плацентарной недостаточности (ПН) для восстановления кровообращения в системе мать – плацента – плод у женщин с данной патологией беременности в третьем триместре, а также снижения медикаментозной нагрузки на организм матери и плода были применены калийные соли (сильвинит) Верхнекамского месторождения.

Согласно нашим многолетним исследованиям калийные соли способствуют активации тканевого дыхания, улучшению параметров легочной вентиляции, положительно

воздействуют на вегетативную нервную и сердечно - сосудистую системы, оказывают иммуномодулирующее, гипотензивное, бактериостатическое действия, нормализуют и стимулируют метаболизм, что послужило основанием для изучения их влияния на механизмы развития плацентарной недостаточности.

Введение

В процессе восстановления маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения беременным назначают значительное количество лекарственных препаратов. Для снижения фармакологической нагрузки на