

4. **Bousquet. De la cocaine en obstetrique.** (Arch. de tocologie, 1890, № 12). **Кокаинъ въ акушерствѣ.**

Для устраненія и уменьшенія боли во время родовъ кокаинъ примѣненъ впервые во Франци *Doleris*'омъ въ 1885 году; онъ смазывалъ шейку матки мазью или 4^o/_o растворомъ и констатировалъ его обезболивающее дѣйствіе. Съ тѣхъ поръ и другіе ученые примѣняли его въ разныхъ видахъ съ тою же цѣлю. Авторъ приводитъ самыя краткія выдержки изъ исторій родовъ 32 роженицъ, у которыхъ онъ примѣнялъ впрыскиванье 1 : 20 раствора (по ¹/₂ шприца въ каждую большую губу), за 5—10 минутъ до рожденія головки, или тампировалъ влагалище кокаинизированною ватой. Кокаинъ примѣнялся въ самыхъ разнообразныхъ условіяхъ — у первородящихъ и многорожавшихъ отъ 17 до 42-лѣтняго возраста, при быстрыхъ и медленныхъ родахъ, оканчивавшихся силами природы и искусственно (въ 10 случаяхъ) щипцами, поворотомъ и дробленіемъ головки, при преждевременныхъ родахъ отъ 5 до восьми мѣсяцевъ, послѣ безуспѣшнаго примѣненія хлороформа и антипирина, и вездѣ боль, если не прекращалась вовсе, то значительно утихала. Такіе результаты вынуждаютъ автора настоятельно больше рекомендовать кокаинъ, какъ вѣрное и дѣйствительное средство въ большаиъ случаевъ. Къ тому же онъ является средствомъ и безусловно безвреднымъ въ дозахъ, не превышающихъ 0,20 cent., такъ какъ осложненія наблюдались лишь при количествахъ отъ 0,75 до 2 gr. (*Reclus*).

А. Гермоніусъ.

5. **Bernays. Zwei Fälle von Extrauterinschwangerschaft durch den Bauchschnitt geheilt** (Deutsche medicin. Wochenschr, № 31, 1890). **Два случая внѣматочной беременности, — излѣченные лапаротоміей.**

Случай 1-й. Г-жа 28 лѣтъ, замужемъ 2 года 4 мѣсяца, явилась на приемъ 27 декабря 1889 г. Жалобы больной состоятъ въ слѣдующемъ: Менструація, бывшая раньше всегда правильная и продолжавшаяся въ теченіе 4-хъ дней, нынѣ длится уже 10 дней. Послѣдніе регулы были 1—4 октября, въ ноябрѣ отсутствовали, а такъ какъ не показывались и въ декабрѣ, то пациентка думала, что она беременна; 13-го декабря почувствовала на столько сильную коликообразную схватку въ нижней части живота, что потеряла сознание. Послѣ этого приступа, у ней появилось кровотеченіе и боли въ нижней части живота являются каждые два часа въ столь сильной степени, что заставляютъ ее корчиться. Подобное состояніе продолжалось вплоть до 15-го января 1890 г., когда ей было произведено авторомъ изслѣдованіе. Послѣднее показало, что шейка матки мягка, полость матки удлинена, слизистая оболочка ея размячена (*decidua*). Тѣло матки смѣщено влѣво. Въ правомъ параметріи опухоль, величиной съ небольшой кулакъ, неподвижная, плотно-прилегающая къ маткѣ. Граница между опухолью и маткою хотя съ трудомъ, но все-таки опредѣляется достаточно точно. На основаніи анамнеза и изслѣдованія авторъ опредѣляетъ внѣматочную беременность. При пробномъ проколѣ черезъ сводъ влагалища, вытекаетъ нѣсколько капель черной крови. Послѣ предварительныхъ приготовленій (теплая ванна, слабительное, покой въ по-