

Акушерскія пособія оказаны въ 6-ти случаяхъ: въ четырехъ поворотъ на ножки по поводу косога положенія (въ трехъ съ выпаденіемъ ручки), въ пятомъ, гдѣ былъ констатированъ разрывъ матки, произведена эмбриотомія (смерть на второй день), въ послѣднемъ — наложены шишцы вслѣдствіе слабости потугъ.

**А. Гермоніусъ.**

**13. А. А. Литкенсъ. Двѣ оваріотоміи.** (Медиц. Обзорніе, 1890, № 24).

Авторъ приводитъ исторію двухъ оваріотомій, сдѣланныхъ имъ въ Орловской губернской земской больницѣ, гдѣ всего оваріотоміей произведено семь—всѣ съ успѣхомъ. Интересъ этихъ случаевъ заключается въ необходимости для земскаго врача „приспособлять данную обстановку и средства къ условіямъ случая“...

Въ первомъ случаѣ была *cystoma ovarii* съ водянкой живота у больной, 26 лѣтъ, дважды рожавшей и болѣе года тому назадъ замѣтившей опухоль; грыжа пупка. Выпущено около 3000 к. с. жидкости. Брюшныя стѣнки кровоточатъ. Киста многокамерная, съ коллоиднымъ содержимымъ, безъ сращеній. Ножка раздѣлена на 4 части и брошена. Въ нижній уголъ раны вставленъ дренажъ, вынутый на 3-й день за ненадобностью.

Послѣоперационное теченіе безлихорадочное; заживленіе первымъ натяженіемъ; выздоровленіе чрезъ 2 недѣли.

Второй случай касается 42-лѣтней больной, крѣпкаго сложенія, рожавшей 8 разъ; опухоль растетъ 1 годъ и 2 мѣс. Сильное кровотеченіе при разрѣзѣ живота; при проколѣ вышло немного густой, кофейнаго цвѣта гущи; опухоль не спалась въ виду многочисленнымъ, мѣстами сплошнымъ и тѣснымъ сращеній, какъ съ брюшной стѣнкой, такъ и съ органами—сальникомъ, толстыми кишками и тонкими; масса лигатуръ, легко прорѣзывавшихъ ткань и частью сваливавшихся за короткостью отрѣзанныхъ частей сращеній. Громадная кровоточащая поверхность, по отдѣленіи всѣхъ сращеній съ кишками, вынимавшихся при всѣхъ этихъ манипуляціяхъ. Плотныя сращенія съ правой боковой стѣнкой живота въ маломъ тазу; увеличенная труба съ гнойнымъ содержимымъ. Ножка (широкая связка), повернутая одинъ разъ вокругъ оси, раздѣлена на-двое и перевязана тремя лигатурами. Больная лихорадила 15 дней, однако, не выше 38,5° (въ первый день 39,5°) и на 20-й день выздоровѣла; заживленіе *per primam*, за исключеніемъ нижняго угла, гдѣ проходилъ дренажъ.

Операции производились въ лѣтнемъ баракѣ, въ первомъ случаѣ при 5 ассистентахъ-врачахъ, во второмъ—при трехъ. Дезинфекція сулемой, хлориновой известью и кипяткомъ. Инструменты и повязки, кромѣ того, стерилизованы при 170° С.

**А. Гермоніусъ.**

**14. Перовъ М. А. Къ казуистикѣ оваріотоміи въ земской практикѣ.** (Медиц. Обзорніе 13—14 1890).

Авторъ въ Никольской земской больницѣ (Вологод. губ.), при крайне неблагоприятной обстановкѣ, благодаря строгой антисептикѣ произвелъ операцию оваріотоміи, давшую прекрасный результатъ, на больной 34 л., которая